

Stellingen behorende bij het proefschrift

SOLID BENIGN LIVER TUMOURS, Biological behaviour and management

1. Bij solide benigne levertumoren heeft er tot nu toe te veel nadruk gelegen op het optreden van complicaties (dit proefschrift)
2. Gezien de toename van obesitas in de samenleving zal de incidentie van multiple adenomen toenemen (dit proefschrift)
3. Indien men bij een contrast-echo van de lever de diagnose hepatocellulair adenoom stelt moet men vervolgens een MRI met leverspecifiek contrast verrichten (dit proefschrift)
4. Voor sommige hepatocellulaire adenomen groter dan 5 cm is een afwach- tend beleid het beste beleid (dit proefschrift)
5. Er is geen reden om, zoals in het verleden gebeurd is, zwangerschap te ontraden aan vrouwen met een hepatocellulair adenoom kleiner dan 5 cm (dit proefschrift)
6. Door het verschil in management van het adenoom bij de man en vrouw is dit voor de chirurg de ultieme vorm van gender specifieke gezondheidszorg
7. Urine kan gebruikt worden voor het differentiëren tussen een benigne en maligne tumor (Metzger, Gut 2012)
8. Radiotherapie is tegelijk een grote toevoeging en een bedreiging voor de borstkanker-chirurgie (Donker, Lancet Oncol. 2014 Nov)
9. Het grootste percentage van maligniteiten ontstaat door pure pech (Vogel- stein, Science 2015)
10. Lachen is de beste pijnstillert (N. Cousins, NEJM 1976)
11. *Wat er in je koppie zit, pakken ze je nooit meer af.* (Elizabeth van Dijke- de Bruijn, Oma)