

NEW INSIGHTS IN CHRONIC PAIN AFTER COMMON OPERATIONS

Propositions

1. Laparoscopic adhesiolysis is less beneficial in the treatment of chronic abdominal pain than laparoscopy alone and should be avoided. (this thesis)
2. Diagnostic laparoscopy can have a long lasting and significant placebo effect. (this thesis)
3. A self gripping mesh is no prophylaxis for chronic postoperative inguinal pain. (this thesis)
4. A self gripping mesh is more efficient than a sutured mesh, reduces operation time and theater costs. (this thesis)
5. The current literature addressing chronic postoperative inguinal pain is highly heterogenic challenging proper comparison of outcomes. (this thesis)
6. Patients with an abdominal aortic aneurysm are at high risk for an incisional hernia after midline laparotomy deserving prophylactic mesh reinforcement. (PRIMA trial, The Lancet 2017)
7. Een chirurg is een dokter die kan opereren en weet wanneer hij dat niet moet doen. (Theodor Kocher)
8. Publiceren is een beetje kennisoverdracht en veel geduld en doorzettingsvermogen. (Dingeman Swank)
9. Minds are like parachutes, they only function when they are open. (Lord Byron)
10. Postoperatief doorgaan met roken is voor de patiënt, die een open centrale vaatoperatie ondergaan heeft, dubbel problematisch in verband met de kans op arteriële trombose en op een littekenbreuk
11. Behandelingen gericht op reductie van pijn moeten eerst hun nut bewijzen door middel van placebo-gecontroleerd onderzoek