

Stellingen

behorende bij het proefschrift

Bipolar Spectrum Disorder During Pregnancy and the Postpartum Period

1. Voor vrouwen met een bipolaire stoornis die een kinderwens hebben dient reeds voor de zwangerschap een peripartum behandelplan te worden opgesteld (dit proefschrift).
2. Bij het vermoeden van een postpartumpsychose is een psychiatrische opname noodzakelijk, bij voorkeur op een gespecialiseerde moeder-kindafdeling (dit proefschrift).
3. Frequentie controle van de lithiumbloedspiegel tijdens de peripartumperiode draagt bij aan het verkleinen van de kans op zowel een recidief ziekte-episode als negatieve moeder- en kinduitkomsten (dit proefschrift).
4. Bij vrouwen met een bipolaire stoornis die vooral kwetsbaar zijn voor depressieve stemmingsepisoden is lamotrigine mogelijk een alternatief voor lithium als onderhoudsbehandeling tijdens de zwangerschap (dit proefschrift).
5. De 'klassieke postpartumpsychose' bestaat niet (dit proefschrift).
6. Psychiaters zouden zich enkel moeten richten op de behandeling van ernstige psychische aandoeningen.
7. Het ongenueanceerd presenteren van wetenschappelijke studies in de media draagt bij aan het veelgehoorde publieke standpunt dat de wetenschap ook maar een mening is.
8. Het voorschrijfgedrag van dokters wordt sterker beïnvloed door de farmaceutische industrie en onmacht dan door de beschikbare wetenschappelijke evidentie.
9. Het is zeer onwenselijk dat slechts een gering deel van het zorgbudget wordt besteed aan preventieve gezondheidszorg.
10. Ontwikkelingen binnen de beschouwende geneeskunde zullen in de toekomst chirurgische ingrepen grotendeels overbodig maken.
11. Roads were made for journeys, not destinations (Confucius, 551-479 BC).

Richard Wesseloo
Rotterdam, maart 2018