

Stellingen

behorende bij het proefschrift:

Chemotherapy induced intestinal mucositis: from bench to bed

Schade aan de darm door chemotherapie: van lab tot bed

Barbara A.E. de Koning

Rotterdam, 9 januari 2008

1. Ondanks de grote verschillen in werkingsmechanismen tussen de cytostatica doxorubicine en methotrexaat induceren beide een vergelijkbare gastro-intestinale mucositis. (Proefschrift)
2. De afwezigheid van Muc2 in de slijmlaag van de darm leidt tot een compensatoire verhoogde expressie van TNF- α en IL-10 van het mucosale immuunsysteem. (Proefschrift)
3. IL-10 vermindert de ernst maar niet de duur van mucositis. (Proefschrift)
4. De opname van Leucine door de darm wordt niet beïnvloed door het optreden van mucositis in kinderen behandeld met chemotherapie. (Proefschrift)
5. TGF- β , heeft als voedingssupplement geen waarde bij de preventie van mucositis bij kinderen behandeld met chemotherapie. (Proefschrift)
6. Voeding is een gewichtig probleem in de gezondheidszorg.
7. Si vis pacem, para bellum (If you wish for peace, prepare for war)
8. Knockout mice are Nobel price material. (Nobel Prize in Physiology and Medicine 2007)
9. Langdurig televisie kijken van kinderen draagt bij aan de ontwikkeling van een concentratiestoornis op volwassen leeftijd. (Pediatrics Vol. 120 No. 3 September 2007, pp. 532-537)
10. Overigens is het een bewijs van een prima verstand, wanneer de mens weet, hoe hij goede vragen moet stellen. (Immanuel Kant)
11. Het is opmerkelijk dat in onze multiculturele samenleving de huidkleurige pleister maar in één kleur te verkrijgen is.