

Rejection and Tolerance after Liver Transplantation

1. Wanneer een donor lever verloren gaat door verschillende vormen van afstoting kort na transplantatie, moet er overwogen worden om HLA tussen ontvanger en donor te matchen en T-cel depletie als een inductietherapie te geven, in plaats van het toepassen van een standaard levertransplantatie. (dit proefschrift)
2. Lang voordat klinische symptomen van afstoting verschijnen in niet-tolerante levertransplantatie patiënten is er een specifiek immuun profiel zichtbaar in het serum. (dit proefschrift)
3. Operationele tolerante levertransplantatie patiënten ontwikkelen weinig fibrose in de lever na het compleet afbouwen van immunosuppressiva. (dit proefschrift)
4. Operationele tolerante levertransplantatie patiënten hebben meer hoog gedifferentieerde donor-reactieve CD4+ T cellen, die mogelijk een zwakkere reactie hebben op alloantigenen in de lever. (dit proefschrift)
5. Er zijn hoogstwaarschijnlijk meerdere manieren waarop een levertransplantatie patiënt operationele tolerantie ten opzichte van de donor lever kan ontwikkelen. (dit proefschrift)
6. Mensen hebben meer empathie voor honden dan voor volwassen mensen. We zien honden als baby's met een vachtje. (Levin et al 2017, Society and Animals)
7. Om het coronavirus (SARS-CoV-2) te overleven moet je immuunsysteem niet te sterk zijn.
8. Je ziet alleen waar je naar zoekt. Daarom is het belangrijk om neutraal en onbevooroordeeld onderzoek te doen.
9. Negatieve resultaten zijn in het onderzoek net zo belangrijk als positieve resultaten.
10. On bended knee is no way to be free
11. It ain't over until it's over