

Stellingen behorende bij het proefschrift

**Inflammatory Monocytes in Bipolar Disorder and
Related Endocrine Autoimmune Diseases**

Rotterdam, 25 februari 2009

Roos Padmos

1. Type 1 autoimmuun diabetes is heterogeen van aard en bestaat uit verschillende subtypes met een verschillende immuunpathogenese.

Dit proefschrift

2. Bij diabetesonderzoek moet rekening gehouden worden met de verschillende subtypes van type 1 autoimmuun diabetes.

Dit proefschrift

3. Activatie van het immuunsysteem is een kenmerk van de bipolaire stoornis.

Dit proefschrift

4. Een factor (of meerdere factoren) uit de omgeving is (zijn) verantwoordelijk voor tenminste een deel van de immuunactivatie in relatie tot de bipolaire stoornis.

Dit proefschrift

5. Een deel van de kinderen met een bipolaire ouder heeft dezelfde immuunactivatie als hun ouder, vooral zij die een stemmingstoornis ontwikkelen.

Dit proefschrift

6. Anti-inflammatoire therapie is een goede additionele therapeutische mogelijkheid voor de bipolaire stoornis.

Müller *et al.*, Mol Psych. 2006;11:680-684

7. Behandeling van depressiviteit bij moeders heeft een positieve uitwerking op de gemoedsstemming van hun kinderen.

Weissman *et al.*, JAMA. 2006;295:1389-1398

8. Het criterium kosteneffectiviteit hoort in de praktijkrichtlijnen van artsen een plaats te hebben.

Brouwer *et al.*, Institute for Medical Technology Assessment

9. Eenzaamheid en gebrek aan sociale contacten betekenen een even groot risico voor een verhoogde bloeddruk als overgewicht of gebrek aan beweging.

Hawkley *et al.*, Psychol Aging. 2006;21:152-164

10. Kou heeft invloed op het ontstaan van verkoudheid.

Johnson *et al.*, Fam Pract. 2005;22:608-613

11. Nastreven van ervaringen maakt gelukkiger dan nastreven van bezit.

James Montier, onderzoek van de internationale zakenbank Dresdner Kleinwort Wasserstein