

Stellingen

Behorend bij het proefschrift:

“Experimental and clinical approaches to hernia treatment and prevention”

1. Een transversale incisie kan littekenbreuken in de bovenbuik voorkomen (dit proefschrift).
2. De endoscopische preperitoneale liesbreukcorrectie van bilaterale liesbreuken kan zowel met één, als ook met twee matten verricht worden (dit proefschrift).
3. Intraperitoneale polypropyleen matten dienen, gezien het vóórkomen van complicaties bij reoperatie, vermeden te worden (dit proefschrift).
4. Herstel van een navelbreuk dient met een kunststof mat verricht te worden (dit proefschrift).
5. Het niet sluiten van trocar incisies leidt tot het vóórkomen van port-site herniae (dit proefschrift).
6. In de gezondheidszorg wordt de prijs, *ceteris paribus*, niet door vraag en aanbod bepaald.
7. Preventie van littekenbreuken met kunststof matten in risicopatiënten is denkbaar.
8. De zogenaamde “360° feedback benadering” en het goedbedoeld opbouwend commentaar zal de ongezouten mening niet snel van zijn plaats verdrijven.
9. Mogelijke centrum-, behandelaar- en volume- effecten moeten, met het oog op een verantwoorde rapportage van gerandomiseerde studies, al in het ontwerp van een trial worden meegenomen.
10. In het algemeen valt een afwachtend beleid ten aanzien van een navelbreukcorrectie bij patiënten met vergevorderd leverfalen en ascites niet te verdedigen.
11. Bei der Eroberung des Weltraums sind zwei Probleme zu lösen: die Schwerkraft und der Papierkrieg. Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden.
Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun

Jens Anthony Halm, zaterdag 16 december 2006