

STELLINGEN

Pre-operatieve behandeling van hoofd/hals plaveiselcelcarcinoom patiënten met thymus hormoon (Thymostimuline), resulteert in een normalisatie van de gestoorde monocyt polarisatie en dendritische cel clustering en tevens in een sterke toename van T-cel infiltratie in tumoren.

(Dit proefschrift)

Cranio-faciale resectie is niet de behandeling van keuze in geval van een adenocarcinoom van het ethmoid.

(P.P. Knegt)

On secondary mandibular reconstruction:

The philosophy of forcing patients to live with their deformity for the sake of proving that they will survive their disease so that they may better appreciate their less than perfect results or so that adequate oncologic surveillance can be maintained should be condemned.

(M.L. Urken, Advances in Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 1994, Mosby-Year Book Inc.)

Bij aspergillose en mucormycose dient naast goede preventieve maatregelen een aggressief beleid t.a.v. diagnostiek en therapie gevoerd te worden.

(J.M. Schmidt, Gegeneraliseerde mycosen in het KNO-gebied, referaat 1994)

The detection of EBV genome in FNA samples of squamous cell neck metastases represents a sensitive and specific marker for nasopharyngeal carcinoma's.

(M.R. Macdonald, Head & Neck 1995;17:487-493)

CO₂-laser surgery is a safe and effective method of treatment for small recurrent squamous cell carcinoma of the glottis after primary radiotherapy.

(J.D.F. Kerrebijn, Clin Otolaryngol 1992;17:430-432)

The supra-omohyoid neck dissection is an anatomically, technically, and oncologically sound surgical procedure, indicated in the management of patients with T2, T3, T4 NO, and selected N1 squamous cell carcinomas of the oral cavity.

(J.E. Medina, Head & Neck 1989;11:111-122)

All bleeding stops.

(J.L. Freeman)