

Stellingen behorend bij het proefschrift 'Active surveillance for low risk prostate cancer.'

1. Active surveillance is gerechtvaardigd bij prostaatkanker met een vermoedelijk laag risico gediagnosticeerd na screening. *(dit proefschrift)*
2. Implementatie via internet van een protocol voor active surveillance in de reguliere urologische praktijk is haalbaar. *(dit proefschrift)*
3. De validiteit van de risico-inschatting van prostaatkanker met de thans gehanteerde inclusie- en follow-up criteria voor active surveillance zal nog moeten worden bewezen. *(dit proefschrift)*
4. Mannen met prostaatkanker die hebben gekozen voor active surveillance hebben een adequate kennis van hun ziekte en een realistische verwachting van deze behandelstrategie. *(dit proefschrift)*
5. Prostaatkankerpatiënten op active surveillance laten ondanks de aanwezigheid van nog onbehandelde kanker gunstig lage scores zien voor wat betreft de door hen beleefde angst en onrust, zowel vlak na de diagnose, als na een follow-up van 9 maanden. *(dit proefschrift)*
6. Bij een patiënt die is behandeld voor kanker gediagnosticeerd na screening overheerst het gevoel gered te zijn, niet de gedachte wellicht onnodig gediagnosticeerd te zijn.
7. In geval van onverklaarde hematurie bij een patiënt met een maligniteit of vasculaire chirurgie in het bekken in de voorgeschiedenis, dient een arterio-ureterale fistel in de differentiaal diagnose te worden opgenomen.
8. De vaak slechte overeenkomst tussen verschillende ziekenhuis-ranglijsten illustreert de beperkte waarde van deze meetinstrumenten.
9. De kwaliteit van het rijgedrag is vaak omgekeerd evenredig aan de grootte van de uitlaat.
10. Met het oog op de geluidsoverlast is het betreurenswaardig dat telefoons tegenwoordig niet meer vastzitten aan een telefooncel.
11. Er bestaan veel vooroordelen over het vak urologie, maar deze leveren wel uitstekende onderwerpen op voor het gesprek tijdens de borrel.