

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

CLINICAL AND LOGISTICAL ASPECTS OF IN VITRO FERTILIZATION TREATMENT

AN ANALYSIS OF A TRANSPORT IVF PROGRAMME

1. Echoscopische controle van de ovariële hyperstimulatie voor IVF in satellietklinieken gaat niet ten koste van de behandelingsresultaten en kan de patiënt belangrijke voordelen bieden. *(Dit proefschrift)*
2. Selectieve foeticide past niet bij de behandeling van infertiliteit. *(Dit proefschrift)*
3. Het hanteren van een stricte leeftijdsgrens van 40 jaar voor IVF getuigt van willekeur. *(Dit proefschrift)*
4. Uitvoerige echoscopische controle van ovariële hyperstimulatie is niet noodzakelijk. *(Dit proefschrift)*
5. In ongeveer 2% van de gevallen geeft IVF behandeling klinische complicaties leidend tot ziekenhuisopname. *(Dit proefschrift)*
6. De keuze tussen standaard IVF en IVF-ICSI dient ook na de eicelpunctie gemaakt te kunnen worden.
7. Eiceldonatie bij postmenopauzale vrouwen bij wie geen sprake is van climacterium praecox is geen geneeskunde.
8. De psychologische belasting van de diagnostiek en behandeling van onvruchtbaarheid is onvoldoende onderzocht.
9. Preventieve gezondheidszorg zonder de beschikbaarheid van adequate curatieve voorzieningen is ongelooftwaardig.
10. Het aanbrengen van een dun laagje vaseline met kristalsuiker is nog steeds een goede behandeling van tweedegraads brandwonden.
11. Wereldwijd gezien is malariaprofylaxe het belangrijkste preventieve middel tegen vroeggeboorte.
12. Vooraanstaande artsen zijn vaak artsen die op tijd vooraan zijn gaan staan. *(Nico Vissel, vrij naar Wim Kan)*

