

Stellingen

1. De prevalentie cijfers van glaucoom van verschillende populatie studies zijn vergelijkbaar, de criteria niet.
2. Regionale verschillen in prevalentie van glaucoom zijn niet op te sporen zonder gebruik te maken van gelijke criteria en onderzoeksmethoden.
3. Het hebben van een eerstegraads familielid met glaucoom geeft een hoger risico op het krijgen van glaucoom dan een verhoogde oogdruk.
4. De familieanamnese over glaucoom wordt door driekwart van de personen onjuist weergegeven.
5. Ten gevolge van een afwijkende corneadikte kan iemand ten onrechte geclassificeerd worden als een patiënt met oculaire hypertensie, echter niet als glaucoom patiënt.
6. Hoewel Imagenet zeer gestandaardiseerd meet, wil dit niet zeggen dat de sensitiviteit voor het stellen van de diagnose glaucoom hoger is dan bij funduscopie.
7. Kamerhoek-afsluitingsglaucoom door gebruik van mydriatica is zeldzaam en wordt als een complicatie gezien; men kan mydriatica ook beschouwen als een provocatietest, mits voorlichting gegeven wordt en nazorg beschikbaar is.
8. 'Target pressure' is een virtuele druk.
9. Alhoewel digitaal opgenomen muziek volgens velen superieur is, bevat deze toch minder data dan de oudervets, analoog opgenomen muziek.
10. De originaliteit van de omslag van een proefschrift is omgekeerd evenredig met de inhoud.
11. Televisie is het beste slaapmiddel dat je met je ogen inneemt.

Stellingen behorend bij het proefschrift "Changing views on open-angle glaucoma. The Rotterdam Study." van R.C.W. Wolfs. Rotterdam, 9 juni 1999.