

STELLINGEN
BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

TIBIAL ULTRASONOMETRY IN CHILDREN

Maarten H. Lequin
Rotterdam, 4 oktober 2000

1. ~~Tibia ultrasonometrie, als kwantitatieve bot meettechniek, kan gebruikt~~
worden in kinderen met een leeftijd tussen 6-19 jaar.
2. Het genereren van referentiewaarden voor de gebruikte tibia ultrasonometrie techniek is noodzakelijk om de klinische toepasbaarheid van deze techniek te kunnen bepalen.
3. Als er een keuze gemaakt moet worden gemaakt tussen de hiel- of scheenbeenechografie als kwantitatieve bot meettechniek, dan heeft de laatstgenoemde (tibia ultrasonometrie) bij kinderen de voorkeur.
4. Na een vergelijking met andere bot meettechnieken, kan men tot de conclusie komen dat geen enkele techniek die bij kinderen gebruikt wordt, ideaal is.
5. Een techniek mag niet tot de "gouden standaard" worden verheven enkel en alleen omdat deze het meest frequent wordt gebruikt.
6. Kinderen die regelmatig cola drinken hebben een vijfmaal zo hoge kans op botbreuken.
7. Een radioloog die houdt van kinderen, is niet per definitie een kinderradioloog.
8. In de regel kost het opbouwen van een "klassieker" meer tijd dan het demonteren.
9. De prijs van de huidige keuken is vaak omgekeerd evenredig aan de tijd die hier in wordt doorgebracht.
10. Op papier is integreren van afdelingen een stuk eenvoudiger dan in de praktijk.
11. "Stakende artsen, minder sterfgevallen" (de kop van een recent krantenartikel) geeft de eed van Hippocrates een nieuwe dimensie.
12. Gezien de grote doses "lichttherapie", moet depressiviteit onder radiologen een zeldzaamheid zijn.
