

Stellingen behorend bij het proefschrift

'Obstructive sleep apnea in children with syndromic craniosynostosis'

1. When parents do not notice difficulty in breathing during sleep of their child with syndromic or complex craniosynostosis the presence of moderate or severe obstructive sleep apnea can almost certainly be excluded. (*dit proefschrift*)
2. Endoscopy of the upper airways is mandatory to identify the level of airway obstruction that causes obstructive sleep apnea before performing a midface advancement in children with syndromic craniosynostosis. (*dit proefschrift*)
3. The general health of children with syndromic and complex craniosynostosis is reported as diminished by their parents. (*dit proefschrift*)
4. Parents and caregivers have to be informed about the behavioral problems, which occur frequently in children with syndromic and complex craniosynostosis, and the possibility for help should be offered. (*dit proefschrift*)
5. To analyze ambulatory polysomnography recordings the sum of the amplitudes of the thoracic and abdominal movements (X flow) seems a valuable alternative assessment in absence of nasal flow. (*dit proefschrift*)
6. Slapen is een ondergewaardeerde bezigheid.
7. Gestandaardiseerde follow-up in multidisciplinaire teams van patiënten met zeldzame aandoeningen komt zowel het onderzoek naar deze aandoeningen als de zorg voor de degenen die er aan lijden ten goede.
8. Mensen met een craniofaciale aandoening hebben altijd een extra last mee te dragen: hun gezicht.
9. Higher scores for IQ in childhood are associated with an increased likelihood of being a vegetarian as an adult. (*Gale et al, BMJ, 2007*)
10. De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven. (*Aristoteles*)
11. Het moederschap is een waardevolle aanvulling op de opleiding tot kinderarts.

Natalja Bannink

Rotterdam, 1 september 2010