

STELLINGEN

behorend bij het proefschrift "*Tumor Progression in Uveal Melanoma*"

C.M. Mooij

- Het is niet nodig uveamelanomen met een diameter aan de basis van 7 tot 10 mm langdurig klinisch te observeren.
- Hoewel het uveameelanoom en het huidmelanoom beide uit melanocyttaire cellen ontstaan, zijn er tussen beide aanzienlijke verschillen in het genotype en phenotype.
- Hoewel er epidemiologische aanwijzingen zijn voor een rol van ultraviolet licht bij het ontstaan van het uveameelanoom, is dit op fysische gronden onwaarschijnlijk.
- De Mib-1 index van het uveameelanoom en het percentage c-myc positieve cellen zijn belangrijke onafhankelijke prognostische parameters voor het uveameelanoom.
- Het peri-oculaire basaalcelcarcinoom dient bij voorkeur chirurgisch te worden ge-excideerd.
- Het is een misvatting te denken dat ongerechtigheid in de wereld alleen voorkomt door schending van een recht.
- Een promotie-onderzoek is, niet alleen een proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap, maar ook een karaktertest.
- In de speelgoedindustrie dient het ontwikkelen van modieus, batterijvrij en milieuvriendelijk speelgoed de hoogste prioriteit te hebben.
- Een verplichte cursus pedagogiek voor zweminstructeurs van jonge kinderen kan de jarenlang oplopende frustraties van de begeleidende ouders/verzorgers sterk verminderen.
- Leven zou een volkomen ondoenlijke onderneming zijn, als men niet langer belang zou hechten aan dingen die van geen belang zijn. (*Cioran, Uitgeverij De Arbeiderspers, 1984 blz. 93*)

