

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift 'Prevalentie en determinanten van glaucoom'.

- 1 . Gemiddeld komt primair open-kamerhoek glaucoom drie maal zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.
- 2 . Boven 80-jarige leeftijd komt primair open-kamerhoek glaucoom 16 maal zo vaak voor als in de leeftijds-categorie 50-60 jaar.
- 3 . In 40 procent van de gevallen met nieuw ontdekt glaucoom is de oogdruk binnen de grenzen van statistisch bepaalde normale waarden.
- 4 . Bij mensen met primair open-kamerhoek glaucoom met een verhoogde oogdruk komt drie maal zo vaak nieuw ontdekte diabetes mellitus voor vergeleken met mensen zonder glaucoom.
- 5 . Bij mensen met primair open-kamerhoek glaucoom met een verhoogde oogdruk komt ruim twee maal zo vaak hypertensie voor vergeleken met mensen zonder glaucoom.
- 6 . Primair open-kamerhoek glaucoom met een normale oogdruk heeft geen relatie met bloeddruk.
- 7 . Bevolkingsonderzoek, waarbij het efficiënt meten van ziekte centraal staat, is over het algemeen ongeschikt voor methodologische studies.
- 8 . Rationele benaderingen zijn niet geschoond van subjectiviteit.
- 9 . Om het effect van ouderdom op gezondheid te meten moeten in ieder geval ook jonge mensen bestudeerd worden.
- 10 . Het niet doorgronde is veruit belangrijker dan alles wat we begrijpen.
(Rainer Maria Rilke)
- 11 . Slecht zien is evenmin een absoluut begrip als slecht zijn.
- 12 . Nachtrust is irrelevant als je overdag maar kan slapen.

