

Stellingen behorend bij het proefschrift  
*Seizures associated with fever in childhood.*  
*Contributions to a rational management*

1. Circa vier procent van alle Nederlandse kinderen maakt ooit een convulsie bij koorts door.  
*dit proefschrift.*
2. Meningitis bij kinderen die zich op de EHBO presenteren met een convulsie bij koorts is zeldzaam, en komt voor bij 1–4%  
*dit proefschrift.*
3. Bij kinderen met een ongecompliceerde (Engels 'simple') convulsie bij koorts zonder petechiën, nekstijfheid, of coma is een lumbaalpunctie om meningitis uit te sluiten niet nodig.  
*dit proefschrift.*
4. De kans op een recidief koortsconvulsie in een nieuwe koortsepisode wordt mede-bepaald door de leeftijd van het kind, de temperatuur bij de eerste koortsconvulsie, de familie-anamnese met betrekking tot convulsies, en het aantal doorgemaakte koortsconvulsies.  
*dit proefschrift.*
5. Hoe langer een kind aanvalsvrij van is koortsconvulsies, hoe lager de kans op een recidief aanval in een nieuwe koortsepisode.  
*dit proefschrift.*
6. Informatie over het type recidief koortsconvulsie (ongecompliceerd of gecompliceerd, Engels 'simple' of 'complex') en de temperatuur waarbij een recidief aanval optreedt, kan van belang zijn bij het vaststellen van de kans op verdere convulsies, bij koorts en zonder koorts.
7. Kinderen met een laag risico op een recidief koortsconvulsie behoeven geen profylactische behandeling.
8. Like music (*Yehudi Menuhin*), epidemiology creates order out of chaos. Like musicians, epidemiologists do not always master their art.  
*Science 1995;269:164-6.*

9. Ondervoeding tijdens het foetale leven en kort na de geboorte heeft permanente gevolgen voor lichaams-bouw en -functie. Om volksziekten zoals hart- en vaatziekten in de komende generatie te voorkómen, dient de aandacht te worden gericht op de voedingstoestand van zwangere vrouwen en en hun pasgeboren kinderen.  
*Barker DJP. Mothers, babies and disease in later life. London, BMJ Publishing Group 1994.*
10. Rationele geneeskunde en betaling per verrichting gaan niet samen.
11. De huisarts dient een jong kind met hoge koorts zelf te zien; de ouders kunnen hiertoe naar de praktijk komen.
12. Elke arts dient het artikel van Pauker en Kassirer *Therapeutic decision making: a cost-benefit analysis* te hebben gelezen.  
*N Engl J Med 1975; 293 (5): 229-34.*
13. De huidige toename in de geboorte van meerlingen zal waarschijnlijk leiden tot een groter aantal kinderen met infantiele encephalopathie.  
*Greter JK, Nelson KB, Cummins SK. Pediatrics 1993;92:854-8.*
14. Evidence based medicine is incomplete medicine.  
*Naylor CD. Grey zones of clinical practice: some limits to evidence based medicine. Lancet 1995;345:840-2.*
15. Make it as simple as possible, but not simpler.  
*Albert Einstein.*
16. Tekenen van foetale nood gedurende de partus kunnen het eerste teken zijn van een pre-existente neurologische afwijking.  
*Adamson SJ, Alessandri LM, Badawi N, et al. Predictors of neonatal encephalopathy in full term infants. BMJ 1995;311:598-602.*
17. Geen gift is kostbaarder dan goede raad.  
*Desiderius Erasmus.*
18. Dat roken de gezondheid schaadt, is geen Koninklijk Besluit.  
*KB 24-4-1981 STB 329.*

M. Offringa,  
Rotterdam, 29 november 1995