

Stellingen bij het proefschrift
The hallux valgus complex
Antal P. Sanders

- 1 Distale osteotomieën van het eerste metatarsale geven biomechanisch een ander resultaat dan arthrodeses van het eerste metatarso-phalangeale gewricht. De kans op recidief is na een osteotomie groter.
(Dit proefschrift)
- 2 De stand van het eerste tarso-metatarsale gewricht kan een voorspelende waarde hebben op de uitkomst van een hallux valgus operatie.
(Dit proefschrift)
- 3 Het inter-phalangeaal gewricht van de grote teen verdient voor en na arthrodesse van het eerste metatarso-phalangeale gewricht meer aandacht, omdat blijkt dat dit gewricht na de fusie beperkingen kan geven in de activiteiten van het dagelijks leven. *(Dit proefschrift)*
- 4 Dat de complexiteit van onderzoekstechnieken in veel gevallen omgekeerd evenredig is met de meerwaarde van de verkregen informatie, blijkt bij de bestudering van de voetvorm en -functie met behulp van een blauwdruk. *(Dit proefschrift)*
- 5 Morton's neuralgie zoekt en vindt men ("klassiek") in de derde intermetatarsaalruimte. In werkelijkheid kan echter elk van de vier intermetatarsaalruimten aangedaan zijn. Het meest frekwent betreft het de tweede of derde.
- 6 Voeten zullen tweederangs behandeld blijven worden zolang: (1) kennis van voetproblemen een ondergeschoven kindje blijft binnen de opleiding tot arts en (2) podotherapeuten (=paramedici), podologen, podokinesiology, podo-orthesiology, orthopedisch schoenmakers en voetverzorgers/pedicures hun handelen niet kritisch beoordelen, geen wetenschappelijke onderbouwing realiseren, adequate informatie-overdracht naar medebehandelaars nalaten en zich naar buiten toe onvoldoende van elkaar weten te onderscheiden.
- 7 De centrale spongiosaplastiek is de methode van eerste keuze bij de behandeling van de pseudarthrose van de tibia.
(Rijnberg WJ, Van Linge B. J Bone Joint Surg 1993; 75B: 926-931)
- 8 Het is onwaarschijnlijk dat de hoge incidentie van heupfracturen rond het vijfenzeventigste levensjaar wordt beïnvloed door het gebruik van oestrogenen gedurende tien jaar aansluitend aan het begin van de menopauze. *(Felson DT, et al. N Engl J Med 1993; 329: 1141-1146)*
- 9 Niet alleen veel patiënten, ook artsen denken nog te vaak dat chronische pijn automatisch samengaat met inactiviteit.
- 10 De goede kwaliteit van een stelling, ermee eens of niet, uit zich vaak in een glimlach bij de lezer.

