

STELLINGEN

1. Bioelectrical impedance analysis (BIA) is niet geschikt om veranderingen in lichaamssamenstelling ten gevolge van groeihormoonbehandeling bij groeihormoondeficiënte patiënten vast te stellen.
2. Niet alle patiënten met groeihormoondeficiëntie (GHD) lijden aan het GHD-syndroom.
3. De sensitiviteit van de 1 mg dexamethason screeningstest bij de ziekte van Cushing is 100%. Bij het syndroom van Cushing benadert deze, maar is niet gelijk aan, 100%.
4. Bij manifeste atherosclerose of diabetes mellitus is een cholesterolwaarde ≥ 5 mmol/l een indicatie voor medicamenteuze therapie.
5. Diabetes zelfcontrole en zelfregulatie is makkelijker te leren dan het instellen van een kleurentelevisie.
6. Een "routine"-ECG bij een patiënt zonder klachten, heeft geen voorspellende waarde en dient derhalve niet gemaakt te worden.
7. Aggressive nutritional support does not prevent protein loss in septic intensive care patients. Streat SJ, et al. 1987 J Trauma 27:262-266
8. The goals of appropriate therapy for those with diabetes should include a serious effort to achieve levels of blood glucose as close to those in the non-diabetic as feasible. Dr Elliot Joslin, 1935.
9. Een zieke patiënt overdrijft niet.
10. Hoewel advertenties soms anders doen vermoeden zijn aandachtsgebieden sub-specialisaties en geen super-specialisaties.
11. Doctor is niet beter dan dokter.
12. Het is beter met, dan over elkaar te spreken.

