

Stellingen behorend bij het proefschrift

INFLUENCING THE EXTREMES OF GROWTH

Too tall too small

Wouter de Waal

Rotterdam, 28 februari 1996

I

De betrouwbaarheid van de bepaling van een eindlengte prognose bij kinderen met een constitutioneel lange gestalte is sterk afhankelijk van de gebruikte voorspellingsmethode en is in het algemeen meer accuraat bij meisjes dan bij jongens

Dit proefschrift

II

De behandeling met hoge dosering geslachtshormonen bij kinderen met een constitutioneel lange gestalte teneinde een lengtereductie te bewerkstelligen is van beperkte waarde en is sterk afhankelijk van de botleeftijd ten tijde van de aanvang van een dergelijke therapie

Dit proefschrift

III

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat een behandeling met hoge dosering geslachtshormonen bij kinderen met een constitutioneel lange gestalte nadelige effecten sorteert ten aanzien van de vruchtbaarheid

Dit proefschrift

IV

Van de kinderen met een kleine gestalte na intrauteriene groeiretardatie vertoont 50-60% stoornissen in de groeihormoon-insulineachtige groeifactor (IGF) as

Dit proefschrift

V

Behandeling met biosynthetisch groeihormoon bij kinderen met een kleine gestalte na intrauteriene groeiretardatie resulteert in een significante, dosisafhankelijke toename van de lengte en de groeisnelheid

Dit proefschrift

VI

In afwachting van de lange termijn resultaten dient de behandeling van kinderen met een kleine gestalte na intrauteriene groeiretardatie met biosynthetisch groeihormoon uitsluitend binnen onderzoeksverband plaats te vinden

Dit proefschrift

VII

Groeihormoonbehandeling bij kinderen met een geringe lichaamslengte na intrauteriene groeiretardatie heeft mogelijk een gunstig effect op het psychosociaal functioneren

E.A. van der Reijden-Lakeman, Growing pains?, Thesis, 1996

VIII

Aangezien borstvoeding een profylactische werking heeft ten aanzien van het optreden van ziekten als atopisch eczeem, voedingsallergie en respiratoire allergie dient het geven van borstvoeding gestimuleerd te worden

U. M. Saarinen, M. Kajosaari, Lancet 1995;346:1065

IX

Het gemiddeld gewichtsverlies van een beginnend arts-assistent kindergeneeskunde is te vergelijken met het gewichtsverlies na een drieweekse trektocht met rugzak door het Himalaya gebergte

X

De hiërarchische structuur binnen een bepaalde afdeling valt gemakkelijk te herleiden door van een ieder de hoogte van de stapel binnengekomen post te meten gedurende de periode van één week

XI

Gezien de verandering in broedpatroon van de Kerkuil (*Tyto Alba*) in de afgelopen 20 jaar valt het te overwegen de naamgeving te veranderen in: Schuuruil, gelijk de Engelse nomenclatuur (*Barn Owl*)

XII

Het besef dat het leven van een parachutist aan een zijden draadje hangt, is geen fortuinlijk geluk maar een doel op zich zelf

XIII

Gezien de gemiddelde lengte van de spelers van de huidige heren-volleybalteams zal een verhoging van de standaard nethoogte leiden tot meer attractief spel

J.A. Snel, Arnhem, 1995

XIV

Een grondrecht dat in onze samenleving op een bedreigende manier onder druk staat maar waar geen mens aan zou mogen tornen is het recht om zwak te zijn

J. Zwagerman, Vals licht, 1991

