

Stellingen

behorende bij het proefschrift

'Het seksueel functioneren van mannelijke patiënten in radiotherapie en urologie'

1. Conformatie radiotherapie bij prostaatkanker lijkt niet beter dan conventionele radiotherapie wat betreft het optreden van erectiele disfunctie.
(dit proefschrift)
2. Bij de differentiaal diagnose en de behandeling van erectiele disfunctie dient de medicus zich te realiseren dat het om de hele patiënt (en zijn partner) gaat en niet alleen om diens penis.
(Moors J.P.C. & Slob A.K.: Tv Seksuol 2000;24:203-214)
3. Kankerpatiënten hebben na behandeling recht op een bevredigend seksleven: specialisten dienen hier bij de therapiekeuze terdege rekening mee te houden.
4. "Cure of cancer can only be achieved if Quality of Life following treatment can be restored to pre-treatment levels".
(Heidenreich A. & Hofmann R.: World J Urol 1999;17:230-238)
5. Psychofysiologisch diagnostisch onderzoek (visuele seksuele stimulatie, tactiele penisstimulatie en intracaverneuze injectie) is een uitstekende functietest bij mannen met erectiele disfunctie. Het feit dat het zelfs niet meer genoemd wordt in de recente '1st International Consultation on Erectile Dysfunction' duidt waarschijnlijk op schroom, verlegenheid en tijdgebrek bij de behandelende specialisten.
(Jardin A. et al. (editors): Erectile dysfunction. Health Publication Ltd.,2000; Plymbridge Distributors, Plymouth)
6. In het medisch curriculum dient aandacht te zijn voor het afnemen van een seksuologische (mini)anamnese.
(Moors J.P.C.: Tv Huisartsen, Suppl Erectiele Disfunctie, 1998:9-14)
7. Er is een groot gebrek aan goed wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van radiotherapeutische behandeling van kanker bij vrouwelijke patiënten op haar seksueel functioneren. Hier dient verandering in te komen.
8. In de specialisatie tot uroloog of tot radiotherapeut zou op zijn minst een korte stage seksuologie verplicht moeten zijn. Thans is zulks alleen het geval in de opleiding tot gynaecoloog.
9. Financiële ondersteuning door de farmaceutische industrie van klinisch wetenschappelijk onderzoek is vaak onontbeerlijk. De onderzoek(st)er dient echter vrij over de onderzoeksresultaten te beschikken en naar eigen goedgevoelen te kunnen publiceren.

10. Het recente artikel n.a.v. een internationale consensus conferentie over definities en classificaties van vrouwelijke seksuele disfuncties is wetenschappelijk gezien belangrijk. Het feit dat alle deelnemenden nauw gelieerd zijn aan één of meerdere farmaceutische industrieën doet het vermoeden rijzen dat financiële motieven prevaleren over wetenschappelijke, seksuologische motieven.
(Basson R. et al.: J Urol 2000;163:888-89. J Sex & Marit Ther 2001;27:83-245)
11. Bij het nasopharynxcarcinoom is neoadjuvante chemotherapie even effectief als gelijktijdige chemotherapie mits gecombineerd met hoge dosis radiotherapie.
12. Het doorgeven van een vadertaal aan je kinderen, naast een moedertaal, blijkt in de praktijk moeilijker dan het lijkt.
13. IzakNicoCornelisRudolfOttoCornelisCornelisIzak: de dagelijkse ergernis als je in Nederland woont en werkt en een Italiaanse achternaam draagt.

Luca Incrocci, 5 september 2001