

Obstructies van de mannelijke tractus genitalis worden gevonden bij 50% van de mannen met ernstige oligozoöpermie (Dit proefschrift).

Congenitale bilaterale afwezigheid van het vas deferens is een milde vorm van cystische fibrose bij ruim de helft van de patiënten (Dit proefschrift).

Genetische risicofactoren zijn aanwezig bij minstens 24% van de mannen met ernstige oligozoöpermie of azoöpermie (Dit proefschrift).

Microchirurgie en cryopreservatie van epididymaal semen is de behandeling van keuze van een epididymis obstructie (Dit proefschrift).

De varicocèle behandeling verhoogt de kans op een succesvolle geassisteerde voortplantingstechniek (Daitsch *et al.*, J Urol 2001, 165:1510-1513).

Colour doppler ultrasound of the acute scrotum is a reliable diagnostic tool and can greatly reduce the number of unnecessary scrotal operations (Dohle *et al.*, Lancet 2001, 357:721-22).

De symptomen van endocriene veroudering van de man kunnen ook worden beschouwd als een gebrekkige acceptatie van de onvermijdelijke gevolgen van het ouder worden.

Het verminderde libido van de oudere man is een belangrijke bron van erectiestoornissen.

Malacoplakie van de urinewegen is succesvol te behandelen met fluoroquinolonen (Dohle *et al.*, J Urol 1993, 150:1518-1520).

De wereldbevolking heeft meer te vrezen van infectieziektes dan van welvaartsziektes als kanker en aderverkalking.

De prominente rol van de zorgverzekeraars bij het wegwerken van de wachtlijsten is ongewenst: zij hebben er namelijk alle belang bij de kosten zo laag mogelijk te houden.

Naast een rookvrije coupé in de trein is er ook behoefte aan GSM-vrije treinstellen.

Stellingen behorend bij het proefschrift "Obstructions of the male reproductive tract: diagnosis and management".