

STELLINGEN
TEN BEHOEVE VAN HET PROEFSCHRIFT

Tibolone and bone

Tib[®]olone en bot

Bernd Berning

1. Tibolone in een dagelijkse dosering van zowel 2.5 mg als 1.25 mg voorkomt vroeg postmenopauzaal verlies van zowel trabeculaar- als corticaal bot door remming van de botresorptie (dit proefschrift).
2. Gedurende het eerste jaar na stoppen van tibolone is er sprake van versnelde verlies van trabeculaar- maar niet van corticaal bot (dit proefschrift).
3. Vaginaal bloedverlies tijdens het gebruik van tibolone treedt vaker op dan tijdens het gebruik van placebo, zonder dat er sprake is van verhoogde endogene oestrogeneenpiegels noch van stimulatie van het endometrium (dit proefschrift).
4. Laat optredend of aanhoudend vaginaal bloedverlies tijdens het gebruik van tibolone maakt uitsluiten van endometriumpathologie noodzakelijk (dit proefschrift).
5. Om de effectiviteit van tibolone aan te tonen met betrekking tot preventie en behandeling van osteoporose is gerandomiseerd klinisch onderzoek met fracturen als eindpunt noodzakelijk (dit proefschrift).
6. Bij het onderzoeken van de borophoubw in de puberteit dient naast lichaamsbeweging en alcoholgebruik ook het gebruik van koolzuurhoudende dranken betrokken te worden.
7. Volgens de systematiek van het CBO met betrekking tot mate van wetenschappelijk bewijs is het verstandiger om twee kleinere gerandomiseerde onderzoeken uit te voeren dan één groot gerandomiseerd onderzoek.
8. Gedachten hebben de eigenschap om zich in je waarnemingen te mengen.
9. Het eindeloos rekken van het bestaan voegt meer jaren toe aan ons leven, maar minder leven aan onze jaren.
10. Botte dokters vangen vaker bot.
11. The past grows gradually around one like a placenta for dying. (John Berger)

