

## STELLINGEN

1

De aanwezigheid van een ongeruptureerd intracranieel sacculair aneurysma bij een patiënt met transient ischaemic attacks vormt geen contra-indicatie voor behandeling met acetyl-salicylzuur.

(Dit proefschrift.)

2

Bij het onderzoeken van families met een verhoogd risico op vaat anomalies zal magnetisch resonantie onderzoek in het geval van intracranieel sacculaire aneurysmata nauwelijks, maar bij arterioveneuze malformaties zeer nuttig zijn.

(Dit proefschrift; Allard et al. *Arch Neurol* 1989; 46: 184-187.)

3

Bij toevallig ontdekte intracranieel sacculaire aneurysmata is het niet zozeer de vraag of, maar meer wie wel en wie niet geopereerd dient te worden.

(Van Crevel et al. *Neurology* 1986; 36: 1335-1339; dit proefschrift.)

4

Een groot deel van de patiënten met een demantie-syndroom, loopstoornissen en verwijde ventrikels op het computer-tomogram lijdt niet aan normal pressure hydrocephalus.

(Vanneste et al. *Neurology* 1992; 42: 54-59; dit proefschrift.)

5

Patiënten met een subarachnoidale bloeding die bij opname comateus zijn, of waarbij computer-tomografisch onderzoek een grote hoeveelheid subarachnoidaal bloed laat zien, zijn niet gebaat bij behandeling met antifibrinolytica.

(Dit proefschrift.)

6

Bij een patiënt die recent is behandeld met cis-platinum, en plots corticaal blind is geworden, is een onmiddellijke behandeling met een anti-epilepticum geïndiceerd.

(Van Geider et al. *Eur J Cancer* 1993; 29A: 1497-1498.)

7

Een kind met verschijnselen van een ongecompliceerde tonsillitis acuta dient alleen direct met antibiotica te worden behandeld, als er een grote (>50%) kans bestaat op de aanwezigheid van streptococci in de keelholte, en de ziekteduur minder dan 48 uren beslaat.

(Dippel et al. *J Fam Pract* 1992; 34: 149-159.)

8

Voor een beleid dat is gericht op het verhogen van de kosten-effectiviteit van het medisch handelen en op het beheersen van de schaarse middelen in de gezondheidszorg is een voorwaarde dat diagnostische en therapeutische keuzeprocessen expliciet en inzichtelijk worden gemaakt, en worden gekoppeld aan goed omschreven patiënten-profielen. Beslissingsanalyse kan daarbij een belangrijke rol vervullen.

9

Bij het beschouwen van een beslissings-analytische studie dient men onderscheid te maken tussen kritiek op de analyse zelf, en klachten over de complexiteit van het keuzeprobleem en het ontbreken van empirische gegevens.

(Dit proefschrift)

10

Soms lijkt de uitspraak "beslissingsanalyse helpt keuzen moeilijk te maken" meer van toepassing te zijn dan "beslissingsanalyse helpt bij het maken van moeilijke keuzen".

11

De randstedelijke forens die reist met de trein en zijn zitplaats zorgvuldig kiest (met de rug naar de rijrichting, en in het geval van een "hondekop" niet in het voorste treinstel) minimaliseert het risico op, en de gevolgen van een ongeval tijdens het woon-werk verkeer. Bovendien kan de tijd die anders verloren gaat met het besturen van een voertuig nuttig worden besteed.

12

De gewoonte een proefschrift op te dragen aan degene die daarvan tijdens de totstandkoming slechts ongetuigd heeft ondervonden, dient op zijn minst als merkwaardig te worden gekenmerkt.

13

Karl Marx heeft nooit bedoeld met zijn stelling in het Communistisch Manifest ("*De bourgeoisie heeft alle, tot nu toe eervuurdige en met vroom ontzag beschouwde beroepen van hun heilige schijn ontdaan. Zij heeft de arts, de jurist, de priester de dichter, de man van de wetenschap in (door) haar betaalde loonarbeiders veranderd.*"), dat de huidige medisch specialist in zijn strijd om behoud van een hoog inkomen zijn bijzondere professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid mag negeren.