

Stellingen behorende bij het proefschrift

Inperken voorkomen

Individuele proactieve agressiehanteringsmethode (IPAM)
in de (dag)klinische kinderveerpsychiatrie en jeugdzorg:
verantwoording en evaluatie

Marije Valenkamp

1. Hoewel het in wetenschappelijk opzicht vooralsnog onduidelijk is welke effecten inperkende maatregelen hebben op de behandeluitkomsten van de kinderen, de negatieve aspecten (letsel, trauma, hoge kosten) die met deze maatregelen worden geassocieerd zijn reden om terughoudend te zijn in het gebruik ervan. (dit proefschrift)
2. Het beschouwen van agressief gedrag van de kinderen op de leefgroep als kwetsend, destructief of inbreukmakend hangt samen met een frequenter gebruik van inperkende maatregelen door pedagogisch medewerkers. (dit proefschrift)
3. Zicht op de aanleidingen en eerste signalen van agressie geeft handvatten voor het voorkomen van escalatie van agressief gedrag op een leefgroep. (dit proefschrift)
4. Het zijn getraind in de technieken van fysieke en ruimtelijke agressiehantering lijkt voor pedagogisch medewerkers een goede basis voor het werken met de Individuele Proactieve Agressiehanteringsmethode. (dit proefschrift)
5. Het is raadzaam de Individuele Proactieve Agressiehanteringsmethode bij kinderen met veel agressief gedrag in te zetten, omdat vooral zij van de interventie lijken te profiteren. (dit proefschrift)
6. De resultaten van dit proefschrift roepen de vraag op aan de koepelorganisaties GGZ Nederland en Jeugdzorg Nederland om een grootschalig effectonderzoek naar de Individuele Proactieve Agressiehanteringsmethode mede te initiëren.
7. Te allen tijden dient te worden onderkend dat een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind een volwaardig en behoorlijk leven dient te hebben, in omstandigheden die de waardigheid van het kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelneming aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken. (General Assembly Resolution, 1990, Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind)
8. Hoe heftig de psychose ook is, het is bij de hantering ervan altijd belangrijk de autonomie van de patiënt zoveel mogelijk te respecteren om zo een werkrelatie mogelijk te maken in het nu en in de toekomst. (Ervaringsdeskundige namens stichting Pandora, Connecting symposium te Amsterdam, 2006)
9. In het richten op een doel kan geactiveerde opgestuwde agressie in positieve zin worden gereguleerd. (J. Bastiaans, 1986, naar K. Lorenz, 1966)
10. Beleidsmakers of ziektekostenverzekeraars, die wijzen op resultaten van gecontroleerd effectonderzoek en pleiten voor stringente beperkingen van de duur van vergoeding voor behandeling, interpreteren de onderzoeksgegevens onjuist. De optimale duur (...) is onbekend. Het is echter aanzienlijk meer dan de tien tot vijftien zittingen die doorgaans in een gecontroleerd uitkomstonderzoek worden geboden. (E. de Beurs, R. van Dyck, A.J.L.M. van Balkom, & A. Lange (2001), Tijdschrift voor Psychiatrie)
11. Het aaneengesloten kijken naar de bloedstollende CBS-serie over de psychopaat Dexter is een aanbevolen sublimatie van de eigen agressie.