

## STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

ASPIRIN IN PREGNANCY

CLINICAL AND BIOCHEMICAL STUDIES

1. Activatie van het fibrinolytische systeem treedt reeds op tijdens de baring vóór de geboorte van de placenta.
2. Het effect van een dieet rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren ter voorkoming van preëclampsie dient nader te worden onderzocht.
3. Het gebruik van een lage dosis aspirine in de zwangerschap is veilig voor moeder en kind.
4. De indicatie tot het voorschrijven van aspirine ter preventie van preëclampsie en foetale groeivertraging kan ook door de huisarts worden gesteld.
5. Unicentrische organisatie is een voorwaarde voor het slagen van multicentrisch onderzoek.
6. Enquête is géén wetenschap.
7. Verplichte cursussen in de opleiding tot gynaecoloog baren goede zorg.

8. Subklinische infectie van decidua-chorion is een belangrijke oorzaak van voortijdige weeënactiviteit.
9. De veronderstelling dat het periconceptionele gebruik van een dagelijkse dosis van 0,5 mg foliumzuur de kans op neuraalbuisdefecten vermindert, maar dat bij een voorgeschiedenis van neuraalbuisdefecten daarvoor 5 mg foliumzuur noodzakelijk is, mist iedere wetenschappelijke basis.
10. Iedere chronische afwijking van de vulva dient te worden gebiopteerd.
11. Laparoscopie is een aanwinst voor de diagnostiek van appendicitis acuta.
12. De kosten van aanschaf van apparatuur voor het verrichten van endoscopische ingrepen zijn veelal omgekeerd evenredig met de ervaring van de gebruiker.
13. In een coffee-shop wordt méér dan zuivere koffie verkocht.
14. Uit medisch oogpunt moet het paarse uiterlijk van het nieuwe kabinet worden gezien als een teken van benauwdheid.

Rotterdam, 19 oktober 1994

Henk Bremer