


DELIRIUM AFTER CARDIAC SURGERY



STELLINGEN

behorende bij het proefschrift van

Roos van der Mast

Rotterdam, 2 november 1994

STELLINGEN

- I Hoge leeftijd en een, preoperatief, lage albumineconcentratie in plasma zijn belangrijke voorspellers voor het optreden van een delirium na een hartoperatie (dit proefschrift).
- II Veranderingen in plasmaconcentraties van de aminozuren tryptofaan en phenylalanine spelen een rol in de pathofysiologie van het postoperatieve delirium, zeer waarschijnlijk door verstoring van de cerebrale neurotransmissie (dit proefschrift).
- III Delirante patiënten zijn lichamelijk ernstig ziek. Het delirium is slechts één van de complicaties van de medische aandoening waaraan zij lijden (dit proefschrift en: Hemert AM van, et al., *J Psychosomatic Res*, 1994; 38: 339-346).
- IV Het optreden van een delirium gaat gepaard met een toegenomen morbiditeit en mortaliteit. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de ernst van de eraan ten grondslag liggende aandoening. In welke mate het delirium zelf, door de gedragsstoornissen en/of door uitputting, hier ook een bijdrage aan levert, is moeilijk in te schatten (dit proefschrift).
- V Hoewel het streven naar valide, preciese en cenduidige diagnoses van psychiatrische ziektebeelden en persoonlijkheidsstoornissen valt toe te juichen, is wetenschappelijk onderzoek niet gebaat bij snel wisselende criteria en definities.
- VI Ontregeling van het serotonerge systeem door een toegenomen tryptofaan-opname in de hersenen is mogelijk een van de belangrijkste pathogenetische factoren bij het ontstaan van hepatische encephalopathie.

Hyperstimulatie van bepaalde serotoninereceptoren, met als gevolg het "serotonine-syndroom" en een vermindering van de cerebrale doorbloeding door de vasoconstrictieve werking van serotonine kunnen hieraan ten grondslag liggen (Bron: Aaldijk C, et al., Acta Neuropsychiatrica 1993; 5: 71-75).

- VII Loochening, niet alleen door de patiënt maar ook door zijn omgeving, vormt één van de belangrijkste obstakels voor vroege opsporing en behandeling van alcoholmisbruik.
- VIII Psychoanalytische steungevende psychotherapie, ook wel steunend-structurerende behandeling genoemd, dient in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is, gedaan te worden door ervaren en ter zake kundige behandelaars (Bron: Mast RC van der, et al., Tijdschrift voor Psychiatrie 1994; 36: 254-264).
- IX Autonomie, het op eigen benen kunnen staan, is een noodzakelijke voorwaarde voor psychologische behandeling van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstructuur. Om deze reden behelst opname op een afdeling psychiatrie geen behandeling, hoogstens voorbereiding erop.
- X "Baat het niet, dan schaadt het niet" geldt evenmin voor een psychotherapeutische als voor een medicamenteuze behandeling.
- XI Hulp bij zelfdoding is levensgevaarlijk (Bron: Heerma van Voss AJ, In: De haas en de jager. Psychische stukken, 1993).
- XII Verplichte nascholing is een voorrecht.

