

STELLINGEN

1. De Wallstent endoprothese heeft de voorkeur boven de plastic endoprothese bij de palliatieve percutane behandeling van maligne galwegobstructie.
2. Complexe Wallstent configuraties bij galwegdrainage zijn instabiel en dienen daarom niet te worden toegepast.
3. Complete drainage is niet altijd noodzakelijk voor voldoende palliatie bij patienten met hilaire galwegobstructie.
4. Het gezegde "de kost gaat voor de baat uit" geldt ook voor de toepassing van de Wallstent endoprothese bij maligne galwegobstructie.
5. Bij palliatieve niet-chirurgische drainage van maligne galwegobstructie is de endoscopische techniek niet vanzelfsprekend de eerste keuze.
6. Binnen enkele jaren zal MRCP de diagnostische ERCP vervangen.
7. MRI is de beste niet-invasieve methode voor het bepalen van de functie van de hartkamers.
8. Preoperatieve beeldvorming van perianale fistels door middel van endo-anale MRI is te prefereren boven endo-anale echografie.
9. Indien obductie is geweigerd, is het zonder expliciete toestemming van de nabestaanden verrichten van post mortem radiodiagnostisch onderzoek onethisch.
10. Het inzicht dat het gemiddelde kind een statistisch begrip is, en geen na te streven ideaal, wordt door veel consultatiebureaus onvoldoende gedeeld.
11. Dat nog 100 jaar na de ontdekking van de röntgenstraling een zich als "kwaliteitskrant" profilerend landelijk dagblad röntgenfoto's van de knieën als mammogram presenteert, illustreert dat de radiodiagnostiek geen voorname plaats inneemt in de modieuze journalistieke belangstelling voor de geneeskunde.

Stellingen behorend bij het proefschrift:
"The percutaneous use of the Wallstent endoprosthesis
in malignant biliary obstruction"

J. Stoker
16 november 1994

