

## STELLINGEN

1. Bij de meeste crurisfracturen die niet met de NSC-methode behandeld kunnen worden, verdient behandeling met de fixateur externe van Hoffmann de voorkeur.
2. De NSC-methode is in het bijzonder geschikt voor de behandeling van crurisfracturen in een opleidingskliniek.
3. Vroeg oefenen van het enkelgewricht bij een crurisfractuur geeft geen beter functioneel herstel.
4. Een geïnfecteerde crurisfractuur dient te worden behandeld met het volgende schema: debridement – fixateur externe – spoeldrainage volgens Willenegger – spongiosaplastiek – "split skin graft".
5. Bij patiënten die op een intensive care unit worden verpleegd, moeten kleine operatieve ingrepen als een tracheotomie of het aanbrengen van een Scribner shunt ter plaatse worden uitgevoerd.
6. Bij acute necrotiserende haemorrhagische pancreatitis moet totale pancreatectomie overwogen worden.
7. Bij hypothermie moet men bedacht zijn op hypokaliaemie.
8. Interne fixatie is de voorkeursbehandeling voor de femurfractuur.
9. Letsels van kniebanden dienen binnen 24 uur operatief behandeld te worden.
10. Voor röntgenonderzoek naar lekkage of perforatie van de tractus digestivus is een zuivere suspensie van Barium Sulfaat zonder additiva te prefereren boven een commercieel Barium Sulfaat preparaat alsook boven wateroplosbare contrastmiddelen.
11. Het Nederlandse cricket gaat gebukt onder een te ambitieus wedstrijdprogramma voor de lagere niveau's.
12. Indien gelijktijdig een chirurgisch proefschrift en een chirurgisch cabaret worden voorbereid, moet men oppassen dat de teksten niet door elkaar gehaald worden.