

## STELLINGEN

### I

De impedantie-cardiografie voorziet in een betrouwbare meting van slagvolume en hartminuutvolume, vooral waar het relatieve veranderingen betreft.

### II

Impedantie-meting kan een belangrijke bijdrage leveren bij het bewaken van patiënten op een intensive care afdeling.

### III

Beta-blokkers blijven 'first drug of choice' bij de behandeling van essentiële hypertensie.

### IV

De combinatie beta-blokker-vasodilator-diureticum vormt een rationele therapie voor ernstige vormen van hypertensie.

### V

Kennis van de plasma-renine-activiteit is slechts zelden van doorslaggevende betekenis bij de keuze van antihypertensieve therapie.

### VI

De virtuositeit van Niccolò Paganini (1782 - 1840) kan geenszins voortvloeien uit het veronderstelde feit, dat deze Genuees aan het syndroom van Marfan geleden zou hebben.

## VII

De combinatie van calcitonine met difosfonaten vormt de beste therapie voor de ziekte van Paget.

## VIII

Het 'partiël consult' levert een aanzienlijke bijdrage tot kostenbesparing in de gezondheidszorg en doet meer recht wedervaren aan de inspanningen van de huisarts.

## IX

Het toedienen van hoge doses diuretica aan patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie is niet alleen zinloos, maar potentiëel gevaarlijk.

## X

De recente explosie van agressiviteit onder chimpansee's in het 'Gombe Stream National Park' in Tanzania is, gezien de gelijkenis tussen aap en Homo sapiens, een logische gebeurtenis.

## XI

Het verlengen van de opleiding tot internist met één jaar moet worden beschouwd als een overgangsfase naar een 10-jarige opleiding.

Rotterdam, 10 oktober 1979

A. Wester