

STELLINGEN.

1. Wanneer er binnen een populatie een positieve seculaire groeiverschuiving in lengte optreedt dan zal deze grotendeels ontstaan zijn tengevolge van lengte toename van kinderen waarvan de ouders een lengte hebben die ligt onder de P50 voor volwassen lengte van die populatie.

A.R. Frisancho, P.E. Cole, J.E. Klayman
1977 Hum Biol 44 : 51.

2. De controle van kinderen met adipositas is eenvoudig en nauwkeurig uit te voeren door met behulp van de triceps huidplooi meting en de bovenarm omvang, armvetoppervlak en armspieroppervlak te berekenen.
3. Bij het evalueren van kinderen met het "small-for-dates" syndroom dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de groep met symmetrische en asymmetrische groeiretardatie.
4. De juiste wijze van profylaxe voor meningeale leukemie bij kinderen met acute lymfoblasten leukemie staat nog geenszins vast.

M. Haghbin 1977 Cancer Treatment Reports
61 : 661.

A.I. Freeman, J.J. Wang en L.F. Sinks
1977 Cancer Treatment Reports 61 : 727.

5. Zowel ten aanzien van de profylaxe als ten aanzien van de behandeling van pneumocystis carinii infectie dient aan een trimethoprim en sulfonamide combinatie de voorkeur te worden gegeven.
6. Aan beenmergpunctie en de uitstrijktechniek daarvan dient tijdens de opleiding en herhalingscursussen van kinderartsen en internisten meer aandacht te worden besteed dan tot nu toe.
7. Een hechte politieke samenwerking tussen Aruba en Curacao zal onder de huidige omstandigheden slechts ontstaan nadat Aruba zelfstandig is geworden.
P.C. Verton 1977 proefschrift Rotterdam
8. De uit noodzaak werkende (gehuwde) vrouw zal, bij ziekte van haar kind bij het ontbreken van opvang mogelijkheden, veelal gedwongen zijn een oneigenlijk gebruik van de sociale voorzieningen te maken.
9. Hoewel men volgens het Nederlandse taalgebruik mag verwachten dat secretaresse de vrouwelijke vorm van secretaris is, zegt hij wat er gedaan wordt en dient zij te doen wat er gezegd wordt.