

S T E L L I N G E N

1

De volwassen grootte van mannelijke ratten wordt mede bepaald door oestradiol dat tijdens een vroege fase van ontwikkeling uit testosteron wordt gevormd.

2

Een testikelbiopsie bij mannen met een oligospermie is voor de prognose van de fertiliteit van grotere betekenis dan de uitkomsten van hormonaal- en ejaculaatsonderzoek.

3

De bepaling van de activiteit van het enzym 5 α -steroidreductase in kernfracties van de epididymis kan geen inzicht geven in de factoren die de activiteit van dit enzym in de epididymis bepalen.

4

Ter voorkoming van het ontstaan van afwijkingen bij het ongeboren kind verdient het aanbeveling de voeding van zwangere vrouwen te voorzien van voldoende zink.

5

Promotiewedstrijden in de tenniscompetitie dienen op 'neutraal' terrein gespeeld te worden.

6

Een belangrijke rol van de lever bij de afbraak van serum 'high density lipoprotein' eiwitten is niet aangetoond.

7

De anastomose van het veneuze systeem van de prostaat met de vene die langs het vas deferens loopt, is een van de oorzaken van het ontstaan van een prostaatvergroting.

8

Hard lopen is goed voor hart en bloedvaten.

9

Er zijn aanwijzingen dat in de huidige medische praktijk de aderlating niet voldoende wordt toegepast.

J.T.M. Vreeburg

Rotterdam, 25 januari 1978