

STELLINGEN

1. De hyperplastische reactie van het ileum op excisie van het jejunum is niet identiek aan die op exclusie hiervan.
2. De hyperplasie van het ileum na een jejunumresectie wordt voor een deel veroorzaakt door andere factoren dan voedsel en darmsappen. Er zijn aanwijzingen voor een humorale factor.
3. Chirurgische deviatie van de ductus choledochus, waardoor gal en pancreassap direct in het ileum wordt gebracht, heeft tot gevolg een verdubbeling van het aantal met azoxymethaan geïnduceerde colon tumoren bij de rat.
4. In de etiologie en de prognose van het coma hepaticum speelt de 'False neuro transmitter' phenyl ethanol amine in plasma en liquor cerebro spinalis een essentiële rol.
5. De subtotale (95 %) pancreatectomie volgens Child, als chirurgische therapie voor de chronische pancreatitis leidt in bijna 100 % van de gevallen tot een diabetes mellitus, die in de praktijk goed reguleerbaar blijkt.
6. Bij onderbeensfracturen wordt de directe behandeling met een goed gemoduleerd bovenbeensgips (near skin cast) veel te weinig gebruikt.
7. Het optreden van recidief ulcera na een parietale celvagotomie is afhankelijk van de operatietechniek. Deze techniek kan verbeterd worden door per operatief de volledigheid van de parietale celvagotomie te controleren.
8. De postvagotomie diarrhee is goed te behandelen met cholestyramine.
9. Onderwijsvernieuwing moet niet uitgaan van het principe 'dat Jan niet mag leren wat Piet niet kan leren'. Op het gebied van de geest is nivellering (nog?) niet mogelijk.

H. J. Eysenck, 'The inequality of man'.

10. Een belangrijk deel van de door openbare vervoermiddelen geproduceerde warmte zou beter aan het comfort van de wachtende passagiers kunnen worden besteed.

24 februari 1978

F. L. R. Bauer.