

STELLINGEN

1

Perifeer zenuwweefsel is immunogeen.

2

Toename van de lengte van een perifeer zenuwtransplantaat gaat gepaard met afname van de kans op doorgroei van regenererende axonen.

3

Allotransplantatie van onbehandelde perifere zenuwen is slechts mogelijk indien de transplantatiereactie langdurig kan worden onderdrukt of vermeden.

4

De uitstekende resultaten die met korte stukjes Lyonerv^R transplantaten werden behaald in het apenmodel wettigen een nader onderzoek van Lyonerv^R transplantaten voor het overbruggen van grote defecten in een optimaal preklinisch model.

5

Het benigne recidief van primaire hyperparathyreoïdie is zeer onwaarschijnlijk.

Bruining, H. A.,
1971, Academisch Proefschrift
Rotterdam

6

Na multiële per-operatieve bloedtransfusies moet eerder een hypo- dan een hyperkaliaemie worden verwacht.

Boelhouwer, R.U. 1978. ter perse

7

Een normale urineproductie welke gepaard gaat met een hoog bloedglucose gehalte in de direct post-operatieve periode suggereert hypovolaemie.

De femoro-femorale bypass is een goed alternatief voor de behandeling van patiënten in slechte conditie met een eenzijdige iliacale afsluiting.

Het lokale gebruik van antibiotica bij verontreinigde operatiewonden is zinvol.

Halasz, N.A., 1977.
Arch. Surg. 112: 1240.

Indien na klinisch en klinisch-chemisch onderzoek van een patient een afsluitings-icterus wordt vermoed, moet slechts dan tot een percutaan cholangiogram worden besloten als verwijde galgangen zijn aangetoond door middel van echografisch onderzoek.

Longmire, W.P., 1977
Current Problems in Surgery 14: 7

Omdat de opsporing van het coloncarcinoom op basis van de anamnese bij psychiatrische patienten moeilijk is kan deze bevolkingsgroep gebaat zijn bij de vroegdetectie door middel van het onderzoek op occult bloed in de ontlasting.