

## STELLINGEN.

De levensduur van thrombocyten kan op betrouwbare wijze worden bepaald met behulp van het irreversibele effect van acetosal op de prostaglandine synthese in bloedplaatjes.

Het placenta infarkt, dat kan worden gezien als uiting van een arteriëel thrombotisch proces, gaat tijdens de zwangerschap samen met een toename van het aantal thrombocyten per liter.

De hoeveelheid malondialdehyde die in bloedplaatjesrijk plasma wordt gevonden na maximale aggregatie van de bloedplaatjes met collageen, is een maat voor de capaciteit van bloedplaatjes om thromboxane A<sub>2</sub> te vormen, maar geeft weinig informatie over het vermogen van bloedplaatjes om te kunnen aggregeren.

Voor evaluatie van het Nederlands verloskundig handelen is een landelijk, vrijwillig informatiesysteem noodzakelijk.

Bij de voorbereiding van artsen voor werk in de ontwikkelingslanden wordt te weinig gewezen op de mogelijkheden van regionale anaesthesie technieken.

Praktische en theoretische kennis van de behandeling van de bedreigde pasgeborene behoort een essentieel onderdeel te blijven van de opleiding tot vrouwenarts.

Laparoscopische inspectie leidt gemakkelijk tot onnodige therapie.

Bij de chirurgische behandeling van het ulcus duodeni verdient de pariëtale celvagotomie de voorkeur.

Het is niet alleen overbodig, maar zelfs gevaarlijk, om bij multipale bloedtransfusies calcium intraveneus te geven.

Het is een misverstand te veronderstellen dat integratie van het kleuteronderwijs in het basisonderwijs de ontwikkeling van het kind ten goede komt.

Bij de toepassing van prostaglandine synthese remmers, zoals acetosal en indometacine, ter bevordering van de sluiting van de ductus arteriosus bij praemature pasgeborenen, is te weinig gelet op de invloed van deze preparaten op de thrombocytenfunctie.

De cent als wettig betaalmiddel behoeft niet alleen om folkloristische redenen te worden gehandhaafd.

Stellingen, behorende bij het proefschrift van  
P.H. van Kessel,  
Rotterdam, 1977.