

## STELLINGEN

### I

In de reactie van het lichaam op weefselnecrose blijkt de lever quantitatief te reageren met de productie van specifieke eiwitten.

### II

Als men enzymconcentraties als criterium voor de grootte van het acute myocardinfarct gebruikt is therapeutische beïnvloeding alleen te bewijzen, indien men veranderingen van het plasmavolume in aanmerking neemt.

### III

Een gelijkblijvend totaal plasma-eiwitgehalte tijdens belangrijke biologische veranderingen in het lichaam sluit aanzienlijke veranderingen in colloïd-osmotische druk niet uit.

### IV

Het gelijktijdig vervolgen van pulmonale capillaire wiggedruk en colloïd-osmotische druk van het plasma, geeft niet alleen informatie over veranderingen in effectieve filtratiedruk, maar ook over veranderingen in de volume - druk relatie.

### V

Voor de diagnose beginnend longoedeem is het maken van een thoraxfoto van de patiënt zowel in liggende als staande houding nodig.

### VI

De verhoging van plasmaviscositeit is eerder gevolg dan oorzaak van het myocardinfarct.

(Kung Ming J., Shu Chien M.D., Bigger J.Th.,  
Circulation, 1975: 1079)

### VII

De veranderingen in  $T_3$ - en  $T_4$ -gehalten na chirurgische ingrepen worden niet geïnduceerd door veranderingen in plasma cortisolgehalte noch door neurogene afferente stimuli vanuit het operatiegebied.

(Brandt M.R., Kehlet H., Skovsted L., Hansen J.M.,  
Lancet, 1976: 1334)

## VIII

Men stelde de diagnose vena lienalis obstructie op de volgende trias van symptomen:

- a) maagfundus varices
- b) hypersplenie
- c) normale leverfunctie inclusief normale ammoniak belastingsproef.

(Smith S.J., Wilson J.H.P., Ned. J. Med. 1974: 54)

## IX

Bij de differentiële diagnostiek tussen intra- en post-hepatische icterus is sonografie als niet invasieve methode aangewezen vooral indien retrograde cholangiografie niet uitvoerbaar is.

## X

De echografie maakt voor de diagnose atrium septum-defect ingrijpende diagnostische methoden overbodig.

## XI

Het is onmogelijk een wetenschappelijk onderzoek over hypertensie te verrichten indien men uitsluitend gebruik maakt van de direct afleesbare kwikmanometer.

(Westerman-van der Horst N.J., acad. proefschrift,  
1976. Rotterdam)

## XII

Het als routine bepalen van het eiwitspectrum in de kliniek is vanwege zijn beperkte doelstelling een geldverspillende bezigheid.

## XIII

De status van den uyl als beschermde roofvogel biedt geen garantie voor het voortbestaan van deze species.