

STELLINGEN

1. Het gebruik van gamma-hydroxybutyraat en ketamine ter inductie van narcose, dient afgeraden te worden bij personen die aan epilepsie lijden.

2. De waarneming van Benda en Perlès dat gamma-butyrolacton (GBL), in de duif, sneller sedatie induceert dan gamma-hydroxybutyraat, werd bepaald door de wijze van toediening. Hun conclusie dat GBL de actieve metaboliet is, is daarom niet gerechtvaardigd.

P. Benda en R. Perlès, C.R. Acad. Sci. (D) 251:1312-1313 (1960).

3. Een door farmaci veroorzaakte toestand waarbij de opricht-reflex van proefdieren afwezig is, wordt veelal ten onrechte als „slaap“ geïnterpreteerd.

4. Een fysiologische zoutoplossing is een zeer slecht placebo voor intra-nigrale injecties.

S. Wolfarth en J.R. Boissier, Pol. J. Pharmacol. Pharm. 28:27-36 (1976).

5. Gezien de verschijningsvormen van epilepsie, zou men in het Nederlands niet moeten spreken van „vallende ziekte“ maar van „overvallende ziekte“.

6. De veronderstelling van Preuss, dat Bil'am aan epilepsie geleden zou hebben, is zeer ver gezocht.

Numeri 24:4

J. Preuss, „Biblisich-Talmudische Medizinen“, Karger, Berlin, 1911.

7. Door het verzwijgen van een ernstige ziekte voor een patiënt, wordt vaak meer leed berokkend dan voorkomen.

8. In het kader van dierenbescherming dient eerder aandacht te worden besteed aan de sportvisserij dan aan dierproeven in de geneeskunde.

9. Het begrip deicide (godsmoord) is godslasterlijk.

10. Ontwikkelingshulp behoort niet vergezeld te gaan van missionaire activiteiten of het opdringen van de westerse cultuur.

11. Spreiding van kennis wordt eerder bevorderd door vertaling van vreemdtalige woorden in het Nederlands dan door vereenvoudigde spelling van zulke woorden.

12. Het roken van tabak in aanwezigheid van niet-rokers dient op zijn minst even strafbaar te zijn als het gebruiken van „soft drugs”.