

STELLINGEN

I

Een nationaal screeningsonderzoek op asymptomatische bacteriurie bij kinderen is voorlopig niet aan te bevelen.

Dit proefschrift.

II

Voor het opsporen van congenitale en verworven aandoeningen van de tractus uropoieticus is onderzoek naar asymptomatische bacteriurie, zelfs met behulp van een urinekweek een onvoldoende sensitieve en specifieke methode.

Dit proefschrift.

III

Kinderen met enuresis dienen altijd onderzocht te worden op het bestaan van urineweginfecties.

Dit proefschrift.

IV

Op de kinderleeftijd speelt de vesico-ureterale reflux een zeer belangrijke rol in het ontstaan van een chronische pyelonefritis; wanneer bij kinderen met urineweginfecties röntgenologisch onderzoek wordt verricht, dient dit derhalve te bestaan uit een IVP en een cystogram.

V

In de huisartspraktijk is de 'dip-slide' het meest betrouwbare diagnosticum voor urineweginfecties.

VI

Het geneeskundig model anamnese-onderzoek-diagnose-therapie heeft vooral zijn waarde bij acute ziekten. Aangezien de huidige geneeskunde steeds meer te maken heeft met chronische ziekten dient er ook in de medische opleiding meer aandacht te worden gegeven aan de controle van het gevoerde beleid en de begeleiding van de chronisch zieke.

VII

Het electrocardiogram is niets meer en niets minder dan een laboratoriummethodiek weergevende de elektrische activiteit van de hartspier op een bepaald moment.

VIII

Het verdient geen aanbeveling ernstig geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen te plaatsen op een kinderdagverblijf voor geestelijk gehandicapten.

IX

Bij het werken met classificatielijsten ten dienste van morbiditeitsregistratie voor ziekten wordt vaak voorbij gegaan aan het feit dat vele patiënten symptomen aanbieden zonder dat deze tot een duidelijke ziektediagnose aanleiding geven. Het zo nodige prospectieve onderzoek in de eerstelijns geneeskunde kan slechts worden doorgevoerd indien tevens symptoomregistratie plaatsvindt.

X

Wijzigingen inzake de structuur van de gezondheidszorg dienen te worden geëvalueerd.

XI

Het begrip grenstiter in de rheumaserologie en het daarmee samenhangende oordeel positief of negatief, dient te worden vervangen door een schaal waarop bij iedere titerhoogte het daarbij voorkomend gemiddeld percentage klinische criteria wordt aangegeven.

A. Cats en F. Klein
Ann. rheum. Dis. (1970), 29, 663.

XII

In Burundi verdient het type vaste stuwdam de voorkeur boven het beweegbare type.

XIII

Het is wenselijk dat er eisen worden gesteld aan het maximum toelaatbare glasoppervlak in woonhuizen, zolang de k-waarde van de toegepaste glasconstructie beduidend hoger is dan die van een geïsoleerde spouwmuur.

XIV

Het ware te wensen dat de Minister van Justitie ongewenst zwanger kon worden.