

STELLINGEN

I

Bij kinderen met een afwijking van het normale looppatroon is naast een onderzoek van de onderste extremiteiten een onderzoek van de rug, met name van de lumbale wervelkolom geïndiceerd.

II

Een bacteriële ontsteking van de tussenwervelschijf is een contra-indicatie voor een intercorporele spondylodese.

III

De diagnose febris e.c.i. bij oudere patiënten mag niet gesteld worden voordat spondylo-discitis is uitgesloten.

IV

Een langdurig bestaande geïnfecteerde defectpseudarthrose van het onderbeen kan met behulp van een centrale spongiosaplastiek in 6 maanden consolideren. Deze afwijking vormt geen indicatie tot amputatie van het onderbeen.

V

Het toedienen van corticosteroïden aan zwangeren teneinde de longrijpheid van de foetus te stimuleren dient vooralsnog achterwege gelaten te worden.

VI

Bij een doorsnijding van de perifere zenuwen die gekenmerkt worden door kwetsing van de zenuwuiteinden, verdient het aanbeveling om een primaire transplantatie uit te voeren.

VII

Bij patiënten met lage rugklachten verdient het in twijfelgevallen aanbeveling het onderzoek uit te breiden met discografie en lumbale phlebografie.

VIII

De Nederlandse arts dient elementaire kennis te bezitten van de pathologie van het bewegingsapparaat en de vaardigheden in het onderzoek van dit apparaat te beheersen. Hiertoe is het nodig dat de bijdrage van de orthopaedie in het curriculum van de medische faculteiten wordt uitgebreid.

IX

Een optimale behandeling van sporttraumata vereist kennis van de technische aspecten van de diverse sporten.

X

Een cursus vergadertechniek dient in het opleidingsschema van de arts-assistenten opgenomen te worden.