

STELLINGEN

I

Indien op een intraveneus pyelogram een ruimte-innemend proces wordt gezien, is sonographie het eerst in aanmerking komende onderzoek.
(dit proefschrift).

II

De oorzaak van een éézijdige niet-functionerende nier op het I.V.P. dient in eerste instantie door middel van sonographie te worden vastgesteld.
(dit proefschrift).

III

In geval van ernstige nier-insufficiëntie geeft een sonographisch onderzoek eerder en gewoonlijk exacter een morphologische diagnose dan het 'high-dose I.V.P.'.
(dit proefschrift).

IV

Voor het vaststellen van een retroperitoneale ophoping van pus of bloed is sonographie de enige in aanmerking komende niet-invasieve methode, indien men niet over computertomographie beschikt.
(dit proefschrift).

V

Aorto-sonographie is onontbeerlijk in het onderzoek van patiënten die men van een abdominaal aorta-aneurysma verdenkt.

VI

De uitspraak van Sufrin, dat chemisch onderzoek van de inhoud van een cyste de aanwezigheid van een tumor in de cyste niet kan uitsluiten, berust op een onjuiste interpretatie van zijn eigen gegevens.
(Urology 1975 6, 507-510).

VII

De aanbeveling van Humphrey en Batty om de internationale eenheden voor immuunglobulines te vervangen door schattingen in mg per ml, gaat voorbij aan de onnauwkeurigheid van deze schattingen en dient daarom te worden afgeraden.
(Clin. exp. Immunol. 1974 17, 708).

VIII

Op de vraag van Stickler 'Moeten er werkelijk nog meer behandelings trials voor otitis plaats hebben?' past het antwoord: 'ja, minstens nog een paar'.
(Am.J.Dis.Child. 1973 125, 403).

IX

Indien na behandeling met antibiotica een ongewoon hoge antistreptolysine-O activiteit blijft bestaan, dient men een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van een monoclonaal antilichaam.

(Lustermans F.A.Th en Klein F.; J.clin. Path. 1977 30, 851-856).

X

Het pituitary dependent Cushing syndroom is van hypophysaire en niet van hypothalamische oorsprong.

XI

Prophylactisch gebruik van anticoagulantia is aangewezen bij iedere patiënt die zowel een thyreotoxicose als atriumfibrilleren heeft, tenzij er dwingende contra-indicaties bestaan. (Staffurth J.S. e. a.; Br. Med. J. 1977, 2, 688-690).

XII

Bij de ziekte van Basedow zonder klinische oogverschijnselen komen in de meerderheid der gevallen oogspierafwijkingen voor.

XIII

Onderzoek naar eosinophilie, die ontstaat na intraveneuze toediening van jodiumhoudende contraststoffen is een onoirbare verspilling van tijd en geld.

XIV

Het dient wettelijk verplicht te zijn, dat een in microgrammen gedoseerd geneesmiddel, zoals levothyroxine, in de apotheek slechts als 1:1000 verwijving aanwezig is.

XV

Onze grote boodschap is te klein.

Rotterdam, 16 december 1977

F. A. Th. W. B. H. Lustermans