

Promotie H.J. Kleinschmidt  
27 februari 1974, 16.15 u.  
Collegezaal 6  
Medische Faculteit  
Erasmus Universiteit  
Rotterdam

---

Receptie na afloop  
van de plechtigheid  
in de foyer.

### Stellingen

1. Habituatie van vestibulo-oculaire reflexen op sinusoidale rotaties van fysiologische frekwentie en amplitude is niet aangetoond.
2. Het onderzoek van de otolietorganen verdient, in verhouding tot dat van de booggangen, een ruimere aanpak dan tot nu toe het geval is geweest.
3. Het diureticum etacrynezuur is gekontraindiceerd bij slechte nierfunctie wegens het gevaar voor irreversibele beschadiging van het binnenoor.

Mathog, R.H., Klein, W.J. (1969): New Engl. J. Med. 280, 1223-1225.

4. Colonpoliepen bij kinderen vormen, in tegenstelling tot het voorkomen ervan bij volwassenen, slechts zelden een indicatie voor radicale chirurgische therapie.

Knox, W.G., Miller, R.E., Begg, C.F., Zintel, H.A. (1960): Surgery 48, 201-210.

5. Dysfunctie van de pylorus als fysiologische sfincter vormt waarschijnlijk een faktor bij de pathogenese van het ulcus ventriculi.

Fisher, R.S., Cohen, S. (1973): New Engl. J. Med. 288, 273-276.

6. Bij een op jeugdige leeftijd ontstane en persisterende heesheid, al dan niet gekombineerd met huidafwijkingen, dient de mogelijkheid van hyalinosi cutis et mucosae ('lipoid proteinosis') te worden overwogen.

Grosfeld, J.C.M., Spaas, J.,

Staak, W.J.B.M. van de, Stadhouders, A.A.

(1965): Dermatologica 130, 239-266.

7. De uiteindelijk blijvende funktiebeperking van een niet behandelde 'mallet finger' is slechts zeer gering.

Huffstadt, A.J.C. (1971): Ned. T. Geneesk.

115, 1049-1052.

8. Nationalisatie van de gezondheidszorg zal pas geloofwaardig kunnen worden wanneer duidelijk wordt aangegeven hoe men de vele (deel)vraagstukken in dit systeem denkt op te lossen.