

STELLINGEN

I

Lage doses subcutane heparine geven een betere bescherming tegen het ontstaan van diepe veneuze trombose in de postoperatieve fase dan orale anticoagulantia.

II

Bij het gebruik van orale anticoagulantia is niet zozeer sprake van trombose-profylaxe als wel van embolie-profylaxe.

III

De indicatie tot het gebruik van de Swan-Ganz catheter bij de chirurgische patient dient ruim gesteld te worden.

IV

De routine toepassing van orale anticoagulantia bij patienten met een oblitererend arterieel vaatlijden is aanvechtbaar.

V

Het gebruik van aminozuren bevattende infusie-vloeistoffen zonder gelijktijdige toediening van voldoende calorieën is zinloos.

VI

Acute cholangitis op basis van concrementen in de extrahepatische galwegen is een indicatie tot acuut chirurgisch ingrijpen.

VII

Wanneer bij een bloeding uit het colon besloten wordt tot een blinde resectie moet aan rechtszijdige hemicolectomie de voorkeur gegeven worden boven een subtotale colectomie, wanneer als oorzaak een bloeding uit een divertikel wordt aangenomen.

VIII

Het verdient aanbeveling in de chirurgische opleidingskliniek een positie te creëren, die wat bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreft gelijkwaardig is aan de positie van "Chief-Resident", zoals die bestaat in een groot aantal Amerikaanse ziekenhuizen.

IX

Late complicaties van het niertrauma kunnen worden vermeden door bij duidelijke afwijkingen op het I.V.P. in de vroege fase na het trauma arteriografisch onderzoek te verrichten, gevolgd door exploratie van de beschadigde nier binnen tien dagen na het trauma.

X

De meso-cavale shunt met behulp van een dacron-prothese is een belangrijke aanwinst bij de chirurgische behandeling van portale hypertensie.

XI

Voor een goede behandeling van het levertrauma is een thoraco-laparotomie vaak een eerste vereiste.

XII

Hockey is een zomersport.