

STELLINGEN

I

De methode van HICKAM en FRAYSER voor het bepalen van de zuurstof saturatie in de retinale vaten is niet kwantitatief.

HICKAM & FRAYSER: *Circulation* 33: 302-316 (1966)

II

De methode van PEREGRIN en DODT voor het bepalen van de bloedlaag dikte in de choroidea van albino konijnen is onjuist.

PEREGRIN & DODT: *Pflügers Arch.* 311: 109-118 (1969)

III

Het effect van carbogeen inhalatie is omgekeerd evenredig met de lengte van de toedienslang.

KETY & SCHMIDT: *J. Clin. Invest.* 27: 484-492 (1948)

IV

Scleraband is een voortreffelijk materiaal voor omsnoerende operaties bij netvlies loslatingen.

V

Het bepalen van de visus en funduscopie zijn niet relevant voor de preventie van chloroquine retinopathie.

VI

Voor het pre-operatief beoordelen van de maculaire functie bij personen met cataract wordt te weinig gebruik gemaakt van het entoptische Purkinje fenomeen.

VII

In een onderontwikkeld gebied kan vijf jaar medisch werk een aantoonbare verlaging van de kindersterfte ten gevolge hebben.

VIII

Het propageren van family-planning in gebieden met een hoge kindersterfte is zinloos.

IX

Het is niet bewezen dat in Kenya xerophthalmie de voornaamste oorzaak van blindheid is.

SAUTER: Preliminary report: Xerophthalmia in Kenya anno 1974

X

Poliklinische patiëntenlijsten dienen vaak als medium voor het voeren van een polemiek tussen de behandelende artsen.

Niek J. A. Bakker

Rotterdam, 11 december 1974