

Stellingen

- I. De intra-luminale druk in het proximale gedeelte van het jejunum is na het uitvoeren van een B □ maagresectie duidelijk hoger dan normaal. Bij de aanwezigheid van divertikels in dit gedeelte van het jejunum is resectie dan ook gewenst.
- II. Er zijn aanwijzingen dat sommige hart vitia in een te laat stadium geopereerd worden.
- III. Wordt bij een gehospitaliseerde patient, op korte termijn, een infauste prognose gesteld dan ware het gewenst dat de huisarts van meet af aan meer direct bij de begeleiding van deze patient wordt betrokken.
- IV. Bij de translumbale aortografie is het noodzakelijk behalve de gebruikelijke voor-achterwaartse opname, ook een zijdelingse opname van de aorta abdominalis te maken.
- V. Het gecombineerde röntgenologische onderzoek van maag en dunnedarm is voor het verkrijgen van goede informatie over de dunnedarm minder geschikt. De dunnedarm dient onderzocht te worden volgens de methode Sellink.
- VI. De rheumatische long nodulus dient bij het vinden van cavitaire longhaarden in de differentiaal diagnose te worden opgenomen.
- VII. Een optimale chirurgische opleiding wordt verkregen wanneer zij gedeeltelijk in een universiteits kliniek en voor een ander deel, in een niet universitair centrum, daar buiten plaats vindt.
- VIII. Het betalen van "goodwill" bij het overnemen van een medische praktijk kan een negatieve invloed hebben op een goede praktijkvoering. Dit gebruik dient zo snel mogelijk te worden geëlimineerd.