

Promotie E.A. Baarsma
4 april 1973, 16.00 u.
Collegezaal 6

Receptie na afloop
van de plechtigheid
in de foyer.

Stellingen

1. Unilaterale labyrinthectomie bij het konijn resulteert in permanente insufficiëntie van de beeldstabilisatie op de retina. Funktionele 'kompensatie' vindt niet plaats.
2. De door Greiner et al voorgestelde periode van de torsieschommel (20 sec) lijkt niet gunstig gekozen gezien de input-output relaties van de booggang-oculaire reflex.
G.F. Greiner (1969): Vestibulométrie clinique
Doin, Paris.
3. Bij het vestibulaironderzoek moet gebruik gemaakt worden van fysiologische prikkeling van het vestibulair apparaat.
K. Jatho (1960): Arch. Ohren usw. Heilk. u. Z.
Hals usw. Heilk. 177, 1-20.
4. Inhalatieprovokatieproeven met allergeenextrakten vormen geen deugdelijk model voor bestudering van een atopie voor een inhalatie-allergeen.
5. De bij hooikoortspatiënten in het neussekreet aangetoonde IgA-antistoffen worden door Turk et al ten onrechte als blokkerende antistoffen aangeduid.
A. Turk et al (1970): Immunology 19, 85-95.
6. De bloeddruk en de gemiddelde flow in een gerekonstrueerd deel van de femoro-popliteale arteriële bloedbaan en de hieruit berekende distale arteriële outflow weerstand korreleren slecht met het al of niet doorgankelijk blijven van deze vaatplastiek.
F.D. Mundth et al (1969): Surgery 65, 197-206.
7. De operatie van eerste keuze bij de chronische recidiverende parotitis is ligatie en extirpatie van het distale deel van de ductus parotideus.
8. De veronderstelling van H. Davis dat de intensiteit van een akoestische stimulus door het auditieve systeem wordt gekodeerd door het aantal 'units' dat respondeert is onjuist.
H. Davis en S.R. Silverman (1970): Hearing and
Deafness, Hfdst. 4, Holt, Rhinehart and
Winston, New York.
9. Mogelijk is het zinvol om bij klinisch gehooronderzoek het frekwentie-analyse vermogen te onderzoeken omdat dit kan steunen op de funktionele kennis van de frekwentie-analyse zoals deze door het gehoororgaan wordt uitgevoerd.
10. De cryochirurgie biedt palliatief en curatief voldoende mogelijkheden om multidisciplinair in een groter medisch centrum succesvol te worden toegepast.