

STELLINGEN

I

Paracetamol wordt in het merg van de menselijke nier geconcentreerd.

II

Paracetamol heeft een natriumretinerende werking; het aangrijpingspunt hiervan ligt in de proximale tubulus.

III

Nierinsufficiëntie bij een lijder aan analgetica-addictie heeft een ongunstige prognose, behalve als er een urineweginfectie bestaat.

IV

De prognose van de zogenaamde idiopathische benigne haematuri is als zeer gunstig te beschouwen.

V

Patiënten, die langdurig met anti-epileptica worden behandeld, dienen prophylactisch extra vitamine D te ontvangen.

VI

De nephritis bij endocarditis lenta is niet het gevolg van septische emboliën maar van de vorming van circulerende immuuncomplexen.

VII

Indien bij een patiënt met een heftige ontsteking van het distale rectumslijmvlies de toucherende vinger gemakkelijk toegang vindt, dient de diagnose gonorrhoeïsche proctitis in de eerste plaats in aanmerking te komen.

VIII

Seniele osteoporose kan met succes behandeld worden met een combinatie van natriumfluoride, vitamine D en calcium.

IX

Afstoting van een niertransplantaat kan met behulp van onderzoek met gemerkt fibrinogeen onderscheiden worden van andere oorzaken voor verlies van functie.

X

Zolang men in Nederland de verkoop van samengestelde pijnstillers vrij laat, zal het aanbod van patiënten aan dialyse- en transplantatiecentra onnodig groot blijven.

XI

Het streven naar polarisatie in de politiek werkt door afsplitsing en nieuwvorming van partijen eerder vertroebelend dan verduidelijkend.