

STELLINGEN

1. Bij het onderzoek van de bloedsomloop door middel van de Valsalva-proef, verdient het gebruik van een matige persdruk gedurende lange tijd, de voorkeur boven krachtig persen gedurende korte tijd.
2. Een kleurstofverduunningscurve kan door onwillekeurig persen van de patiënt zódanig worden vervormd, dat ten onrechte aan het bestaan van een septumdefect wordt gedacht.
3. De zogenaamde "pressure-overshoot" in de intra-arterieel geregistreerde bloeddruk-curve na beëindiging van de Valsalva-proef, ontstaat voornamelijk door vergroting van de stroomsterkte en niet door een tijdelijk persisteren van de verhoogde totale perifere weerstand.
4. Bij de behandeling van patiënten met een vers hartinfarct dient men voor een vlotte defaecatie zorg te dragen.
5. Indien men genoodzaakt is apparatuur door middel van vloeistoffen te steriliseren, kan men het best gebruik maken van benzalconiumchloride (Cetavlon) in een concentratie van 0.2 tot 0.5%.
6. Men dient alle te transfunderen eenheden bloed na te zien op de aanwezigheid van "Australië-antigeen".
(N. T. v. G. 1971, 38:1575-1576)
7. Patiënten met een ongecompliceerd hartinfarct kunnen zonder bezwaar na ongeveer tien dagen worden gemobiliseerd.
8. Renine-suppressie bij essentiële hypertensie ontstaat door verhoogde intravasculaire druk ter hoogte van het juxta-glomerulaire apparaat.
(Clinical Science, 1970, 38, 101-110)
9. Myocardlaesies na radiotherapie van mediastinale tumoren kunnen worden opgevat als late stralingseffecten.
10. Ondervoeding bij jonge kinderen treedt in de Verenigde Staten van Amerika in een vroegere levensfase op, dan in de meeste ontwikkelingslanden.
(New Engl. J. Med. 1970, 282:933-939)
11. De aanwezigheid van onverteerde voedselresten in steriele urine wijst op het bestaan van een psychiatrisch ziektebeeld.
12. De cylinderinhoud van motoren in personenauto's dient in het belang van de volksgezondheid beperkt te worden tot twee liter.