

STELLINGEN

1. Bij toepassing van spierrelaxantia tijdens de narcose is het gebruik van een perifere zenuwstimulator onmisbaar.
2. Na toediening van spierrelaxantia in buik- en thoraxchirurgie is spontane ademhaling gedurende de narcose onjuist.
3. Het oraal toe te dienen analgeticum bezitramide (Burgodin^R) is een waardevolle aanwinst bij de bestrijding van chronische pijn.
4. Gecoördineerde pijnbestrijding is een spoedeisende zaak in Nederland.
5. Een patiënt dient in beginsel te worden ingelicht over de diagnose en prognose van zijn ziekte.
6. Tijdens de medische vorming is kennisneming over de psychologie van het ziek- en sterfbed onontbeerlijk.
7. Transbronchiale punctiebiopsie tijdens bronchoscopie is een belangrijk hulpmiddel bij de diagnose van vele mediastinale afwijkingen.
8. Bij de discussies over de vasectomie als sterilisatie-methode wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de huwelijksrouw van de vrouw uitgangspunt is.
9. Bij middenoordoofheid na schedeltrauma is exploratieve tympanotomie aangewezen.
10. De klinisch-medicus dient nauwer wetenschappelijk contact met de pharmacoloog te onderhouden.
11. Er dienen onverwijld veiligheidsvoorschriften voor de operatiekamer, verkoeverkamer en de afdelingen voor intensieve verpleging te komen.
12. In verband met het promotiediner verdient het aanbeveling de uitroep "hora est !" te vervangen door "horeca est !".