

STELLINGEN

I

De bepaling van de plasmaviscositeit is bij uitstek de methode om de activiteit van chronische ziekteprocessen te vervolgen.

II

De gedefibrineerde bloedbezinking is alleen bruikbaar voor het aantonen van een sterk verhoogd gammaglobulinegehalte.

III

De stelling, dat de belangrijkste functie van het albumine bestaat in handhaving van de colloïdosmotische druk, is onjuist.

IV

Dieetadviezen ter preventie van het hartinfarct zijn wetenschappelijk ongefundeerd.

V

Het serumijzer, dat onder physiologische omstandigheden aan transferrine is gebonden, komt uitsluitend tot in de drie-waardige vorm voor.

Gaber, B. (1970). *Biochim. Biophys. Acta* 221, 228.

VI

De verlengde stollingstijd, die kortelings bij konijnen met een deficiëntie van component C6 van het complementsysteem is beschreven, berust meer op de aanwezigheid van een zwakke inhibitor of op een artefact dan op de afwezigheid van een stollingsbevorderend enzym.

Zimmerman, T.S. (1971). *The Journal of Exp. Med.* 134, 1591.

VII

Het feit dat bij 2% van de patiënten verdacht voor een enteritis uit de faeces *Yershinia enterocolitea* wordt gekweekt, bewijst niet dat deze bacterie pathogeen geacht moet worden.

Noyen, R. van, (1970). *Ned. T. v. Geneesk.* 114, 188.

VIII

Indien het technisch mogelijk is een rectum carcinoom te reseceren, dient dit te geschieden, ongeacht het feit of er haematogene metastasering is.

IX

Bij een wetenschappelijk onderzoek op klinisch gebied is de samenstelling van de contrôlegroep belangrijker dan die van de patiëntengroep.

X

Aangezien het paard weer het vervoermiddel van de toekomst wordt, dient de overheid de oprichting van meer paardenfokkerijen te bevorderen.