

STELLINGEN

1. De primaire behandeling van sphinctersclerose bij meisjes dient te bestaan uit urethrotomia interna.
2. Bij een tweede urineweginfectie bij meisjes dient een volledig urologisch onderzoek te geschieden.
3. Een priktol-configuratie van de urethra op het mictie-urethrogram wijst op de aanwezigheid van urethrale pathologie bij meisjes.
4. Geen enkele vorm van urethrale pathologie bij meisjes kan uitsluitend op röntgenologische gronden worden vastgesteld.
5. De toeneming van klebsiella-infecties in ziekenhuizen hangt samen met het misbruik van antibiotica.
6. Tijdens grote operaties, uitgevoerd bij pasgeborenen, is contrôle van de lichaamstemperatuur van uitzonderlijke betekenis.
7. Tijdens een onderhouds-therapie met cordarone is regelmatige oogheelkundige contrôle noodzakelijk.
8. Midden-West-Nederland dient spoedig te kunnen beschikken over een nieuwe, oostelijke aanvoerweg van zoetwater vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal.
9. Het is raadzaam dat er een onderzoek wordt opgezet, waarbij de waarde van de verschillende piano-technieken op wetenschappelijke wijze wordt onderzocht.
10. In de nabije toekomst zal steeds sterker de behoefte worden gevoeld om te komen tot groepsvorming en centralisatie van urologische praktijken.