

STELLINGEN

I

Het verband tussen hydrocephalus en hartziekten met verhoogde centrale veneuze druk is nog onvoldoende onderzocht.

II

Zowel de vroege als de late traumatische intratemporale perifere facialisparese dient conservatief behandeld te worden.

J.W. Aldren Turner, *Lancet* 1: 756-757, 1944.

III

Het syndroom met hyponatriaemie en hypernatriurie bij patienten met een schedeltrauma of na intracranieële operaties wordt waarschijnlijk niet veroorzaakt door een overmatige productie van antidiuretisch hormoon.

K.K. Gupta, *Lancet* 1: 866, 1971.

IV

Cerebrale angiografie bij zuigelingen kan zonder trauma aan het arteriële vaatstelsel geschieden door injectie van contrast in het linker hartgedeelte na transeptale catheterisatie via het foramen ovale vanuit de vena femoralis.

V

Bij de asphyctische pasgeborene (AS 5 of minder) dient men na uitzuigen van mond en keelholte eerst natriumbicarbonaat en glucose intraveneus toe te dienen, alvorens tot andere resuscitatie pogingen over te gaan.

VI

Bij bewusteloze patienten met een trauma capitis is het vereist alvorens uitvoerig lichamelijk onderzoek te doen, röntgenfoto's van de halswervelkolom te maken.

VII

Het is onjuist de diagnose subarachnoidale bloeding te stellen op grond van sanguinolente liquor zonder onderzoek naar de xanthochromie hiervan.

VIII

Het aantal neurochirurgische centra in Nederland moet niet verder worden uitgebreid, eerder worden beperkt.

IX

Enkele kritische beschouwingen *) over "The predicament of mankind", een studie van de zgn. Club van Rome, impliceren ten onrechte dat beoefenaren van de wetenschap die een diagnose stellen van kwalen waaraan de wereld lijdt, zelf ook en tegelijkertijd de therapie moeten aangeven.

*) nl. van H.J.A. Hofland in NRC-Handelsblad van 11 okt. 1971 en van A. Kreykamp in de Nieuwe Linie van 7 okt. 1971.

X

De kreet "baas in eigen buik" dient eerder het voorkómen van ongewenste zwangerschap dan voortijdige beëindiging hiervan in te houden.